

### Retour de la portance

- Gérer les épis (paturin commun, fétuque...)
- Gérer les refus ou les hauteurs de sortie excessivement hautes

		Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 16/04 au 22/04	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord		45	10.2
Zone Intermédiaire		61	12.3
Zone Sud	Nord Loire	31	10.5
	Sud Loire	36	10.7
MOYENNE REGION		39	10.6



Fauche du 17/04 et photo du 24/04

Les jeunes repousses de fétuque ont rougi et les repousses de dactyle sont très claires (manque de minéralisation et de photosynthèse)

Les conditions climatiques de la semaine passée n'ont pas pu permettre une bonne croissance de l'herbe (gelées matinales, vents froids, peu d'ensoleillement). Ceci a eu pour conséquence une pousse inférieure aux moyennes de saison. Les températures plus clémentes on l'air de se profiler à partir du 8 mai.

## La Gestion des épis et des refus

Les fétuques élevées et les ray grass hybrides sont en montaison (également les paturins communs, flouves odorantes...). *Cependant*, avec les conditions météo de la semaine dernière les gaines se sont durcies et sont peu appétantes, il conviendra donc de gérer ces épis soit en débrayant les paddocks les plus avancés, soit par la coupe des refus. On remarque actuellement une hauteur de sortie souvent haute autour de 9 cm en lien avec des hauteurs entrées très élevées et des gaines non consommées. Si ces gaines ne sont pas coupées, nous ne pourrions pas descendre en dessous 9 cm herbomètre au prochain tour de pâturage à moins de débrayer la parcelle à destination de la fauche pour sa prochaine exploitation.

## Les prairies sous couvert

Il faut surveiller de près la portance car c'est le principal critère pour ne pas mettre en difficulté la prairie en dessous. Pour les méteils semés à base d'avoine et riches en légumineuses (même en fleur) nous pourrions garder une valeur correcte jusqu'au 15 mai. Pour info, en mai un méteil fourrager peut gagner environ +120 kg de MS/jour/ha ce qui permet de gonfler les rendements et le bilan fourrager.

## Gestion du pâturage : 2 situations

Il y a ceux qui ont des terres saines et qui ont déjà pu déprimer leurs parcelles et qui vont commencer le 2<sup>ème</sup> voire même le 3<sup>ème</sup> tour de pâturage : Les hauteurs optimales de retour se situent entre 11 et 13 cm, pas moins car


bien souvent cette année les hauteurs de sortie du tour précédent ont été plus hautes. Il faudra bien veiller à ce que le stade 3 feuilles soit bien atteint.

Et il y a ceux qui ont des terres très humides qui n'ont pas pu être pâturées et qui actuellement se retrouvent avec des hauteurs très élevées et des épis déjà sortis (houle laineuse, paturin commun, flouve odorante, fétuque...). Faire pâturer ce genre de couvert sera très difficile car peu appétent et pauvre en valeur fourragère ce qui va générer de nombreux refus. La fauche est certainement la meilleure des solutions ou sinon attendre encore 8 jours pour gérer ces stocks en topping car une météo plus printanière semble se profiler, plus propice à la réussite de cette technique. Il faut laisser préfaner 12 à 24 h, le temps d'avoir une odeur de « préfané ». Actuellement les conditions météo ne sont pas réunies pour une réussite optimale.

Le pâturage des repousses de RGI fauché récemment pourront soulager temporairement le circuit de pâturage le temps de laisser une hauteur de repousse suffisante sur les autres parcelles.

## Fertilisation

Les derniers épandages d'engrais pourront se faire cette semaine avec de bonnes conditions (quelques averses annoncées, et le mois de mai a généralement des conditions poussantes). Un apport de 30 unités est suffisant à cette période de l'année.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

**Chambre d'agriculture Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)

**SEENOVIA** 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)