

Des opportunités de pâturage à saisir

Les brebis ont la faculté de pâturer de multiples types de couvert, qu'il s'agisse de semis, de repousses ou bien de chaumes. Pour les prairies qui sortent d'une période de sécheresse, il est nécessaire d'attendre 3 semaines après les premières pluies pour disposer d'un stock d'herbe suffisant à pâturer. Les dérobées peuvent être pâturées un mois et demi après la levée. Le sorgho fourrager peut être exploité six à huit semaines après son implantation sous réserve qu'il atteigne une certaine hauteur. Les variétés Sudan Grass présentent un moindre degré de toxicité et les brebis peuvent entrer sur la parcelle dès que le sorgho mesure 40 cm de hauteur. Pour les variétés hybrides, il est impératif d'attendre 60 cm. Un pâturage au fil est nécessaire pour limiter le gaspillage. Par ailleurs, les chaumes de sorgho grains peuvent être pâturés sans restriction. Il en est de même pour le moha.

Après une période de sécheresse, le pâturage des prairies peut reprendre 3 semaines après les pluies



*Maurane BEAUMONT, Laurent FICHET, Stéphane MIGNÉ,
Chambre d'agriculture des Pays de la Loire
Laurence SAGOT, Institut de l'Élevage/CIIRPO*



UNE JOURNÉE SANITAIRE le **Mercredi 20 NOVEMBRE 2019**

de **9 h 45 à 17 h 30** sur le thème de « **L'AGNELAGE** ».

L'agnelage est l'un des moments clés en élevage ovine et la mortalité des agneaux est toujours un moment difficile à vivre pour un éleveur. Elle demeure une des principales causes de perte de productivité dans de nombreux élevages avec un impact économique important : agneaux morts nés, avortements, agneaux mous, chétifs, diarrhées, essoufflements, arthrites... sont autant de soucis rencontrés par les éleveurs.



Au programme

Nous vous proposons un **programme basé** sur la **préparation des brebis, l'agnelage** et les **soins aux jeunes agneaux** :

- La **préparation des brebis dans le dernier tiers de gestation** : le parasitisme, l'alimentation, les maladies,...
- **Le colostrum**,
- **L'agnelage** : les naissances avant terme et les avortements, le cas d'un agnelage normal, comment faire lors d'un agnelage difficile, la réanimation, ...
- **Les premières heures de la vie de l'agneau** : elles sont capitales,
- **Les infections des jeunes agneaux** : les colibacilles, la coccidiose, la cryptosporidiose,...

Cette journée sera animée par **Pierre AUTEF, vétérinaire spécialiste Inn'Ovin** avec expérience de la production ovine en région Limousin, **salle de la loge à BEAUPREAU le matin** et **élevage de l'EARL JMF PITON l'après-midi**.

Contacts :

- Sylvie PINEAU Assistante 02 41 96 77 00
- **Laurent FICHET Conseiller Ovin** 06 26 64 30 92 - 02 41 33 61 25 laurent.fichet@pl.chambagri.fr