

**ACTUALITÉS**

**Céréales à paille**

Stade 2 nœuds à fin épiaison : Surveillez l'évolution des symptômes de maladies foliaires. Vigilance septoriose sur blés, principalement en cas de pluie dans les prochains jours. Calculez vos risques fusariose et cécidomyies.

**Colza**

Stades G4 à G5 ; formation des siliques en cours. Surveillez les pucerons cendrés et les maladies foliaires.

**Maïs et tournesol**

Semis en cours. Surveillez les limaces, mettez en place les pièges.

**Protéagineux**

Surveillez le botrytis sur féverole d'hiver. Surveillez les pucerons noirs sur féveroles et les pucerons verts du pois

Accéder au site de la Surveillance Biologique du Territoire en cliquant [ici](#)

**CURSEURS DE RISQUE**

**BLES**

**Pucerons :**



**Cécidomyies :**

**Septoriose :**

- Pour les semis d'octobre et novembre de variétés sensibles :



- Pour les semis de variétés sensibles de décembre et variétés peu sensibles d'octobre :



- Pour les semis de variétés peu sensibles de novembre et décembre



**Rouille jaune :**

- Pour les variétés sensibles



- Pour les variétés tolérantes



**ORGE**

**Rhynchosporiose :**



**COLZA**

**Charançon des siliques :**

- Pour les colzas à G2 et + :



**Pucerons cendrés :**



**ABONNEMENT BSV**

Retrouvez le bulletin de santé du végétal sur le web...

- [www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr)
- [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)
- [www.polleniz.fr](http://www.polleniz.fr)

... ou inscrivez-vous en ligne pour être informé directement par mail de chaque nouvelle parution :  
<https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/>

# CÉRÉALES À PAILLES




## Réseau d'observation

23 parcelles sont renseignées cette semaine sous VGobs avec la répartition suivante :

- 2 Loire-Atlantique, 7 Maine-et-Loire, 3 Mayenne, 6 Sarthe et 5 Vendée.
- 17 blés tendres, 1 blé dur, 4 orges et 1 triticale.

## Stade phénologique et état des cultures

Les stades s'échelonnent de **2 nœuds** à **fin épiaison** dans les parcelles du réseau. Les orges du réseau sont entre les stades **dernière feuille dégainée** et **début épiaison**. Les stades au sein d'une même parcelle sont souvent hétérogènes.



Des symptômes de **Jauisse Nanisante de l'Orge (JNO)** sont toujours signalés hors réseau dans plusieurs parcelles d'orge en sud Vendée, Mayenne, Sarthe, et dans le réseau en Loire-Atlantique. Pour des semis très tardifs (parcelle en cours de tallage), des pucerons sont actuellement observés sur feuillage (parcelles d'orge de printemps...). Ils sont susceptibles de transmettre le virus de la JNO.

Des symptômes de **maladie des pieds chétifs** sont visibles sur une parcelle d'orge de Vendée (variété Coccinel).

Des **symptômes physiologiques** sont observés par endroit sur feuillage (pointes de feuilles brûlées, décoloration). Attention à ne pas les confondre avec des symptômes de maladies.

Des galeries de **mineuses** sont visibles sur les feuilles de certaines céréales, sans incidence.

Des **criocères des céréales** sont observés au stade adulte. Les premiers œufs sont aussi observés. Ce sont les larves qui rongent les feuilles mais les dégâts restent anecdotiques sur les parcelles. Le risque est faible pour les cultures.



Œuf de criocère sur blé



Larve de criocère sur blé



Adulte de criocère sur blé



## • Pucerons des céréales

### Observations et analyse du risque

Des **pucerons** sont signalés sur 16 parcelles du réseau avec 2 à 20% des tiges porteuses d'au moins un puceron. Ils sont visibles sur épi sur 1 parcelle. Les auxiliaires (coccinelles, syrphes, micro-hyménoptères parasitoïdes...) sont actifs dans les parcelles pour réguler les populations. Ils sont observés dans 5 parcelles du réseau.

### Voir « Reconnaître les auxiliaires prédateurs de pucerons » en fin de BSV

Les pluies de ce week-end n'ont pas été favorables aux pucerons. Le temps annoncé pour les prochains jours sera plus favorable à leur activité.

### Période de risque

De la sortie des épis au stade grain pâteux.

### Seuil indicatif de risque

À partir d'un épi sur 2 colonisé par des pucerons (50% d'épis touchés) dans la parcelle.



## • Cécidomyies

### Observations et analyse du risque

Les premières parcelles sont en cours d'épiaison et entrent en période de risque. Le ravageur n'est pas signalé dans le réseau.

La présence de cécidomyies est très liée à la parcelle et aux conditions climatiques. Des conditions climatiques orageuses sont favorables à ce ravageur.

Conditions climatiques favorables à la phase d'accouplement et aux pontes :

- Temps lourd en soirée
- Températures supérieures à 15°C et vent faible (< 7 km/h).

Sensibilité variétale	Historique de la parcelle	Rotation sur la parcelle	Dominante du type de sol	RISQUE
Variété résistante (*)				<b>0</b>
Variété sensible	Historique sans cécidomyies	Rotation sans Blé/Blé	Sableux	<b>1</b>
			Limoneux	<b>1</b>
			Argileux (+ craie)	<b>2</b>
		Rotation avec Blé/Blé	Sableux	<b>3</b>
			Limoneux	<b>3</b>
			Argileux (+ craie)	<b>4</b>
	Historique avec cécidomyies	Rotation sans Blé/Blé	Sableux	<b>5</b>
			Limoneux	<b>5</b>
		Rotation avec Blé/Blé	Argileux (+ craie)	<b>6</b>
			Sableux	<b>7</b>
Limoneux	<b>7</b>			
Argileux (+ craie)	<b>8</b>			

ARVALIS - Institut du végétal, 2012

(\*) Résistance aux cécidomyies orange. Attention, une autre cécidomyie existe : la jaune (*Contarinia tritici*), qui peut ponctuellement être présente et occasionner des dégâts, même sur les variétés résistantes aux cécidomyies orange.

NB1 : Un semis précoce (avant le 10 octobre) augmente le risque de cécidomyies.

NB2 : Le labour provoque un étalement des émergences dans le temps rendant plus difficile leur contrôle.

0 : parcelle ne présentant aucun risque

1 à 4 : parcelle présentant un risque faible. La pose d'un piège est tout de même conseillée afin de surveiller les populations.

5 à 6 : parcelle à risque. La pose de cuvettes jaunes doit être effectuée afin de surveiller si un traitement est nécessaire

7 à 8 : parcelle à fort risque d'attaque. Une observation toutes les 48h, voire journalière, à l'aide de la cuvette jaune est préconisée afin de déclencher le traitement à la bonne date.

**À partir du moment où il y a un risque, même faible, positionner des cuvettes jaunes.** Le haut de la cuvette doit se situer à la base de l'épi. Relevez le piège tous les jours ou tous les 2 jours.



## • Cécidomyies (suite)

**Méthodes alternatives**

Bon à savoir pour les prochains semis : le choix d'une variété résistante est le meilleur moyen de lutte contre la cécidomyie orange en situation de risque fort.



### Période de risque

De début épiaison à fin floraison

### Seuil indicatif de risque

Les seuils sont atteints lorsqu'on capture 10 insectes par 24h ou 20 par 48h. L'observation d'insectes le soir en position de ponte sur les épis, en présence d'un temps chaud sans vent est déterminante.

## • Fusariose

### Analyse de risque

À l'approche de la floraison, la **fusariose des épis** est la dernière maladie avant la récolte pour laquelle une intervention peut être nécessaire. Selon la sensibilité variétale et le risque agronomique de la parcelle, des contaminations peuvent avoir lieu si les conditions climatiques encadrant la période de floraison sont instables (pluies importantes et forte humidité de l'air).

Les blés durs sont à surveiller plus particulièrement car plus sensibles à la maladie.

Les pluies annoncées pour la fin de semaine pourraient être favorables à la maladie.

**Calculez le risque fusariose sur vos parcelles à l'aide de la grille ARVALIS ci-dessous :**

Gestion des résidus*		Sensibilité variétale		Risque
<p>Céréales à paille, colza, lin, pois, féverole, tournesol</p>	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	1	
		Moyennement sensibles	2	
	Techniques sans labour ou résidus en surface	Sensibles	3	
		Peu sensibles	2	
		Moyennement sensibles	2	
		Sensibles	3	
<p>Betteraves, pomme de terre, soja, autres</p>	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	2	
		Moyennement sensibles	3	
	Techniques sans labour ou résidus en surface	Sensibles	3	
		Peu sensibles	2	
		Moyennement sensibles	2	
		Sensibles	4	
<p>Mais et sorgho fourrages</p>	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	2	
		Moyennement sensibles	2	
	Techniques sans labour ou résidus en surface	Sensibles	4	
		Peu sensibles	4	
		Moyennement sensibles	5	
		Sensibles	6	
<p>Mais et sorgho grains</p>	Labour ou résidus enfouis	Peu sensibles	2	
		Moyennement sensibles	3	
	Techniques sans labour ou résidus en surface	Sensibles	4	
		Peu sensibles	5	
		Moyennement sensibles	6	
		Sensibles	6	
		Sensibles	7	

1 et 2 : le risque fusariose est minimum et aucun traitement spécifique vis-à-vis des fusarioses n'est à envisager, quelles que soient les conditions climatiques.

3, 4 et 5 : le risque est moyen et les conditions météorologiques lors de la floraison seront déterminantes pour justifier d'un traitement.

Risque 3 : traiter spécifiquement vis-à-vis des fusarioses en cas de climat humide (cumul de pluie > 40 mm pendant la période entourant la floraison).

Risque 4 et 5 : si, à la floraison, le temps est sec (cumul de pluie < 10 mm pendant +/- 7 jours entourant la floraison), aucun traitement contre la fusariose ne devra être envisagé.

Risque 6 et 7 : selon vos conditions agro-climatiques (variété sensible et/ou travail du sol en non labour sous précédent maïs ou sorgho grain et/ou forte hygrométrie), le traitement sera nécessaire dès le début de la floraison. Dans ce cas, ce traitement spécifique doit être positionné dès l'apparition des premières étamines.



## • Maladies du pied

### Observations et analyse du risque

Des symptômes de **piétin verse** sont observés cette semaine sur 2 parcelles de blé tendre (variétés Apache, Rubisko, Complice et Aguila) et 1 parcelle de blé dur avec 10 % des plantes atteintes. La maladie est aussi observée hors réseau en Maine-et-Loire.

L'impact sur le rendement du piétin verse est en général relativement faible. Pour cette maladie, la mise en œuvre d'une intervention chimique dépend de 3 critères : **sensibilité variétale, agronomie et climat de l'année**. Pour en savoir plus, [voir BSV du 7 avril](#).

D'autres maladies du pied peuvent être observées.

Cette semaine, des symptômes de **rhizoctone** sont signalés sur 1 parcelle de blé tendre de Vendée avec 10 % des plantes atteintes.



### Reconnaître les différentes maladies du pied

<p align="center"><b>Piétin verse</b></p> <p>Plaque noire (stroma) sur la gaine inférieure qui résiste au passage du doigt, toujours située en dessous du premier nœud.</p>	<p align="center"><b>Rhizoctone</b></p> <p>Tache bien délimitée avec une couleur claire au centre, de type « brûlure de cigarette ». Si présence de points noirs, ils ne résistent pas au passage du doigt. Symptômes pouvant aller jusqu'au 2ème -3ème nœud.</p>	<p align="center"><b>Fusariose sur tige</b></p> <p>Tache brun violacé ayant la forme d'un trait de plume qui suit les nervures.</p>

## • Oïdium

### Observation et analyse du risque

La maladie est observée sur 2 parcelles de Maine-et-Loire sur 10 (Apache : assez sensible) à 70 % des tiges. Sur l'une des parcelles, des symptômes sont aussi visibles sur 15% des F3 et 5% des F2 définitives. Des symptômes sont aussi visibles hors réseau. Les parcelles où la végétation est dense sont plus sensibles à la maladie. Le risque oïdium est actuellement faible. Surveillez les variétés très sensibles.

### Période de risque

À partir du stade «épi 1 cm».

### Seuil indicatif de risque :

- Variétés sensibles : présence de plus de 20 % de F3, F2 ou F1 déployées atteintes sur au moins 5 % de la surface foliaire
- Variétés tolérantes : présence de plus de 50 % de F3, F2 ou F1 déployées atteintes sur au moins 5 % de la surface foliaire

Quelle que soit la variété, le risque est faible si l'oïdium reste cantonné aux tiges.



Oïdium sur blé



## • Rhynchosporiose

### Observations et analyse du risque

Des symptômes sont visibles sur 2 parcelles d’orge du réseau dans la Sarthe à (variété Etincel, Rafaela). Ils sont visibles sur 10 à 30% des F3 définitives et sur 5% des F2 sur une des parcelles.

Hors réseau, la rhynchosporiose est observée sur les variétés d’orge Augusta, KWS Cassia et Etincel.

L’évolution de la maladie est à surveiller particulièrement pour les variétés sensibles.

### Période de risque

À partir de 1 nœud.



CAPDL

Rhynchosporiose

## • Rouille jaune



Pour les variétés sensibles



Pour les variétés tolérantes

### Observations et analyse du risque

La **rouille jaune** n’est pas signalée dans le réseau. La maladie est observée hors réseau sur l’ensemble de la région, notamment sur les secteurs de Bournezeau, Chavagnes-en-Paillers et La Boissière de Montaigu (Vendée) sur triticales mais aussi sur blé.

Des foyers de rouille jaune ont été signalés dans des parcelles en blé tendre hors réseau sur les variétés Filon (peu sensible) et Advisor (assez résistant), RGT vivendo ainsi que sur variété et Hyfi (très sensible). Sur blé dur, la maladie est observée sur variété RGT Voilur (assez résistante) dans le secteur de Saumur (49).

### Période de risque

À partir de 1 nœud.

### Seuil indicatif de risque

En présence des premières pustules sur l’une des 3 feuilles supérieures.



Rouille jaune

soufflet

Les résultats des analyses de prélèvement de rouille jaune sur la campagne 2018-2019 ainsi que le protocole d’envoi d’échantillons sont disponibles [ici](#), dans la catégorie « suivi des maladies »



## • Rouille brune

### Observations et analyse du risque

La maladie n'est pas signalée dans le réseau cette semaine. Elle est signalée hors réseau en Maine-et-Loire avec une faible intensité et en Vendée sur variété Talendor (sensible).

### Période de risque

À partir de 2 nœuds

### Seuil indicatif de risque

En présence des premières pustules sur l'une des 3 feuilles supérieures



Rouille brune

CAPDL

## • Septoriose



Pour les semis d'octobre et novembre de variétés sensibles



Pour les semis de variétés sensibles de décembre et variétés peu sensibles d'octobre



Pour les semis de variétés peu sensibles de novembre et décembre

### Observations et analyse du risque

La **septoriose** est signalée dans 21 des 23 parcelles renseignées.

L'intensité des symptômes est variable entre les parcelles : Dans la grande majorité des cas, moins de 10 % de la surface foliaire des feuilles touchées présentent des symptômes.

Pour les parcelles à 2 nœuds :

Feuille du moment	Nombre de parcelles renseignées	Nombre de parcelles avec symptômes	Fréquence d'attaque sur les parcelles touchées
F3	2	1	20 % des F3 touchées
F2	2	0	/
F1	2	0	/

Pour les parcelles à 3 nœuds et dernière feuille pointante :

Feuille du moment	Nombre de parcelles renseignées	Nombre de parcelles avec symptômes	Fréquence d'attaque sur les parcelles touchées
F3	6	3	5 à 80 % des F3 touchées
F2	6	1	5 % des F2 touchées
F1	6	0	/

Les variétés du réseau concernées (3 nœuds et +) :

- Apache : 80 % des F3 touchées et 5 % des F2
- Complice : 5 % des F3 touchées.



## • Septoriose (suite)

Pour les parcelles à DFE et + :

Feuille du moment	Nombre de parcelles renseignées	Nombre de parcelles avec symptômes	Fréquence d'attaque sur les parcelles touchées
F3	13	11	10 à 100% des F3 touchées (moy : 45 %)
F2	13	5	5 à 20% des F2 touchées (moy : 12%)
F1	13	0	/

Les variétés du réseau concernée

- Hyfi : 100 % des F3 touchées et 0 % des F2
- Cellule : 80 % des F3 touchées, 0 % des F2
- Apache : 40 % des F3 touchées, 0 % des F2
- Aguila : 15 % des F3 touchées, 0% des F2
- LG Absalon : 0% des F2, F3 touchées
- LG Armstrong : 0% des F3 touchées
- Rubisko : 15% des F2 touchées

### Modèle Septolis (Arvalis)

Cette année, les modélisations se feront pour 1 à 2 stations météo par département sur les cas types suivants :

- Variété sensible : Advisor
- Variété peu sensible : LG Absalon

Pour les dates de semis :

- Semis précoce : 25/10
- Semis intermédiaire : 15/11
- Semis tardif : 05/12

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des modélisations .

**ATTENTION** : le modèle déclenche en fonction d'un pourcentage de contamination sur F4 et F3 définitives et non sur un pourcentage de symptômes sur feuilles ce qui peut expliquer les différences entre le modèle et les observations au champ.

	LG Absalon (peu sensible)			Advisor (sensible)		
	25/10/2019	15/11/2019	05/12/2019	25/10/2019	15/11/2019	05/12/2019
Nantes	D	D	m			D
Angers	D	D	m		D	D
Ernée	d	m	f		D	d
Laval	m	m	f	D	D	d
Le Mans	D	D	m			D
La Roche-sur-Yon	D	d	m			D

données météo réelles jusqu'au 19/04 - prévisions jusqu'au 27/04

	seuil dépassé
D	seuil de risque franchi cette semaine
d	le modèle déclenche en début de semaine prochaine (26 avril - 29 avril)
m	le modèle déclenche en fin de semaine prochaine (30 avril - 2 mai)
f	le modèle déclenche au-delà
	hors période de risque



## • Septoriose (suite)

Les pluies orageuses du 19 avril ont de nouveau alimenté les contaminations avec des niveaux variables selon la pluviométrie : écarts prononcés entre stations météo : la Sarthe et surtout la Mayenne ont été moins arrosées depuis début avril ce qui contribue à différer le franchissement du seuil

Le stade dernière feuille étalée est atteint ou en passe de l'être dans de nombreuses situations (avance par rapport à la médiane historique de 15 à 20 jours selon les situations).

Soyez très vigilants pour les variétés sensibles et les semis précoces avec les possibles pluies de fin de semaine qui pourraient être favorables à de nouvelles contaminations et à la montée de la maladie sur les étages foliaires supérieurs.

### Période de risque

À partir du stade 2 nœuds.


### Seuil indicatif de risque

Au stade 2 nœuds.

- Variétés sensibles : 20% des F2 du moment déployées (F4 définitive) présentant des symptômes
- Variétés peu sensibles : 50 % des F2 du moment déployées (F4 définitive) présentant des symptômes



Septoriose sur blé




## • Septoriose de l'orge

La **septoriose de l'orge** n'est pas une maladie courante et préjudiciable des cultures d'orges en France. Cependant suite à une détection de *Parastagonospora avenae* f.sp.*triticea* signalée en janvier 2016 par les autorités chinoises, espèce de quarantaine en Chine, des actions sont entreprises depuis pour mieux caractériser les espèces en présence et augmenter les mesures de prévention. Ainsi, la surveillance des symptômes de septoriose de l'orge a été renforcée dans les réseaux d'épidémiologie et les expérimentations.

Merci d'en tenir compte dans les observations et de faire remonter l'information, si vous observez la maladie .



Septoriose de l'orge





## • Helminthosporiose (orge)

### Observations et analyse du risque

La maladie est observée sur 1 parcelle du réseau au stade début épiaison cette semaine avec 25 % des F3 et 5 % des F2 présentant des symptômes. Elle est observée hors réseau sur variété Etingel et KWS Jaguar.


La maladie se développe quand les températures sont douces et le temps humide.

### Période de risque

À partir de 1 nœud

### Seuil indicatif de risque

- Sur les variétés sensibles : si plus de 10% des feuilles sont atteintes
- Sur les variétés tolérantes : si plus de 25% des feuilles sont atteintes



## • Rouille naine (orge)

### Observations et analyse du risque

La maladie n'est pas observée dans le réseau. Hors réseau, l'intensité des symptômes reste actuellement très faible.

### Période de risque

À partir de 1 nœud

### Seuil indicatif de risque

- Sur les variétés sensibles : si plus de 10% des feuilles sont atteintes
- Sur les variétés tolérantes : si plus de 50% des feuilles sont atteintes





# COLZA


## Réseau d'observation

11 parcelles sont renseignées cette semaine sous VGobs avec la répartition suivante :

- 1 Loire-Atlantique, 3 Maine-et-Loire, 2 Mayenne, 2 Sarthe et 3 Vendée.

## Stade phénologique et état des cultures

Les parcelles du réseau sont au stade **siliques bosselées (G4)**. Hors réseau, la maturation des grains est en cours sur certaines parcelles.



Hors réseau, des **larves de méligèthes** sont observées dans les fleurs de colza, suite à une forte présence des adultes au moment de la floraison. Ces larves ne sont pas dommageables pour les colzas mais la fleur a avorté suite à la ponte de l'adulte dans le bouton floral.



Larves de méligèthes sur colza

CAVAC



## • Charançon des siliques et cécidomyies

### Observation et analyse de risque :

Pour les colzas à G2 et +

Les **charançons des siliques** sont observés sur 7 parcelles cette semaine. 5 cuvettes sont positives avec 17 charançons piégés au total. Sur ces parcelles, 0,1 à 1 individu est observé par plante en moyenne. Une partie du vol a déjà eu lieu. Les conditions des prochains jours devraient être favorables à ce ravageur. Soyez vigilants et observez les plantes !

Des charançons de la tige du colza peuvent aussi être encore observés mais les colzas ne sont plus en période de risque vis-à-vis de ce ravageur.



Les débuts de vols de charançons des siliques peuvent avoir lieu à partir de 15°C. Ils sont fréquents à partir de 17°C.

Seules les larves de charançon sont peu nuisibles (destruction de 4 à 6 graines par siliques). Par contre, les piqûres de ce charançon au niveau des siliques constituent une porte d'entrée pour les cécidomyies dont les larves occasionnent la destruction de la silique entière.



Cécidomyie adulte piégée dans la cuvette jaune



Larves de cécidomyies dans une silique

### Reconnaître le charançon des siliques



Le charançon des siliques se caractérise par sa couleur gris ardoise et des bouts de pattes noirs.

Charançon de la tige du colza



Baris



Charançon des siliques



### Période de risque

À partir de G2.

### Seuil indicatif de risque

1 charançon pour 2 plantes en moyenne à l'intérieur du champ. L'observation des bordures est utile pour cet insecte qui les colonise préférentiellement en début d'infestation.



## • Pucerons cendrés

### Observations et analyse du risque

Des colonies de **pucerons cendrés** sont signalées sur 10 parcelles, principalement près des bordures. Les colonies sont plus nombreuses cette semaine : en moyenne sur ces parcelles, 1,05 colonies/m<sup>2</sup>. Leur présence est en progression par rapport à la semaine passée. Une parcelle, avec 5 colonies/m<sup>2</sup> (en bordure) dépasse le seuil indicatif de risque. Le retour d'un temps plus sec dans les prochains jours est favorable à l'activité des pucerons.

Observez en particulier les bordures des parcelles. Les auxiliaires sont aussi observés dans les parcelles (coccinelles, chrysopes, pucerons parasités par des micro-hyménoptères...).

Voir « Reconnaître les auxiliaires prédateurs de pucerons » en fin de BSV

### Période de risque

De mi-floraison au stade G4

### Seuil indicatif de risque

À partir de 2 colonies/m<sup>2</sup>. Surveillez les bords des parcelles.



Colonie de pucerons

CA 53

## • Phoma

La maladie n'est pas signalée cette semaine dans le réseau.

Méthodes  
alternatives



Le risque Phoma est réduit par les pratiques culturales (export de pailles du précédent, apports d'engrais organique limités en été, période optimale de semis, densité de semis limitée) et le choix variétal.



CAPDL

Phoma sur feuille



CAPDL

Phoma sur collet



## • Sclérotinia

### Observations et analyse du risque

La maladie est observée dans 2 parcelles de Vendée sur 5 à 10 % des feuilles et tiges.

La **gestion de cette maladie s'envisage au stade G1**. Ce stade est dépassé sur l'ensemble des parcelles du réseau.

#### Méthodes alternatives



- Rotations avec des cultures non hôtes du champignon
- Réduction du potentiel infectieux de la parcelle par l'utilisation d'un agent fongique de lutte biologique, *Coniothyrium minitans* (souche CON/M/91-08) Logo biocontrôle avec lien : <https://ecophytopic.fr/protéger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

### Période de risque

À partir du stade G1

### Seuil indicatif de risque

Il n'existe aucun seuil de risque. Le risque est fonction :

- De la présence de cultures sensibles dans la rotation et de leur nombre (colza, pois, tournesol, soja, luzerne...)
- De la présence de sclérotinia sur la parcelle les années passées
- Des conditions climatiques avant, pendant et après la floraison

Le temps durant la floraison sera déterminant en permettant ou non à la maladie de s'extérioriser. Une humidité relative supérieure à 90% au niveau du couvert végétal pendant 3 jours et une température moyenne d'au moins 10°C seront ainsi favorables à cette maladie. À cet effet, la présence de précipitations n'est pas indispensable à la maladie pour progresser.

## • Autres maladies

Des symptômes de **cylindrosporiose** sont observés sur 1 parcelle du réseau sur 10% des plantes en Maine-et-Loire. Hors réseau, la maladie est aussi observée.

La **verticilllose** n'est pas signalée cette semaine.

La **Pseudocercosporiose** est signalée sur 1 parcelle du réseau avec 15% des plantes atteintes.

Des symptômes de **mycosphaerella** sont signalés sur 2 parcelles du réseau et hors réseau sur plusieurs parcelles de Mayenne.

### Reconnaitre les symptômes de maladies sur colza



Pseudocercosporiose



Mycosphaerella



Cylindrosporiose sur feuille



Cylindrosporiose sur tige

CAPDL



## • Orobanche rameuse



### Focus adventices

L'**orobanche rameuse** a été observée hors réseau en sud Vendée. Il s'agit d'une plante parasite du colza, dépourvue de chlorophylle et de racines. Son apparition doit être surveillée dans les parcelles à risque et/ou en variétés sensibles.

Au printemps, l'**orobanche rameuse** est caractérisée par une tige jaune pâle le plus souvent ramifiée d'une hauteur de 10 à 30 cm, qui va rapidement se transformer en hampe florale entre avril et juin. Ses petites fleurs sont jaune pâle cernées de bleu violet. Sa présence s'accompagne d'un phénomène de **nanisme du colza associé à une chlorose des feuilles**. Dans les situations très infestées, il y a perte de pieds en particulier sur les variétés sensibles.

Chaque année, l'orobanche du colza produit une multitude de graines (100 000 à 1 million de graines par pied). Les graines sont minuscules (0,2 à 0,3 mm) et d'une très grande viabilité dans le sol (plus de 13 ans). L'orobanche du colza se développe principalement sur colza mais peut également se développer et produire des graines en parasitant des adventices dont une vingtaine est très présente en culture de colza.



Orobanche à maturité

Terres Inovia

## Les abeilles butinent, protégeons-les !

### Respectez les bonnes pratiques phytosanitaires

1. Les traitements insecticides et/ou acaricides sont interdits, sur toutes les cultures visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs, pendant les périodes de floraison et de production d'exsudats.
2. Par dérogation, certains insecticides et acaricides peuvent être utilisés, en dehors de la présence des abeilles, s'ils ont fait l'objet d'une évaluation adaptée ayant conclu à un risque acceptable. Leur autorisation comporte alors une mention spécifique "emploi autorisé durant la floraison et/ou au cours des périodes de production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles".
3. Il ne faut appliquer un traitement sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d'emploi associées à l'usage du produit, mentionnées sur la brochure technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage de la spécialité commerciale autorisée.
4. Afin d'assurer la pollinisation des cultures, de nombreuses ruches sont en place dans ou à proximité des parcelles en fleurs. Il faut veiller à informer le voisinage de la présence de ruches. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Il faut éviter toute dérive lors des traitements phytosanitaires.



# MAÏS ET TOURNESOL

Les réseaux maïs et tournesol se mettent en place.

Les semis de maïs sont en cours dans certaines parcelles de la région. Les stades vont de **semis à 2 feuilles**.

Certains semis de tournesol ont également débuté. Des dégâts d'oiseaux sont signalés sur certaines parcelles de tournesol en Mayenne.

Des ravageurs du sol peuvent être observés sur les parcelles.

Des larves de **tipules** sont signalées dans des parcelles de maïs en Sud Vendée et des parcelles de tournesol en Mayenne.



Les **larves de tipule** sont de couleur grise. Elles sont dépourvues de pattes et ne s'enroulent pas sur elles-mêmes lorsqu'elles sont dérangées. La larve est généralement détritivore et n'occasionne pas forcément de dégâts sur la culture. Sur maïs, les attaques se caractérisent par des coupures irrégulières de feuilles. Les attaques sont plus souvent observées après prairie ou lorsque le couvert est détruit à une date proche du semis du maïs.



## • Limaces

### Observations et analyse du risque

Les **limaces** ne sont pas signalées dans le réseau cette semaine. Les précipitations de ce week-end ont pu favoriser l'activité des limaces dans les parcelles. Les conditions des prochains jours devraient être moins favorables.

Au moment du semis, des dégâts de limaces peuvent être observés dans les parcelles. **Positionnez les pièges à limaces.**




2 espèces de limaces sont particulièrement nuisibles en grandes cultures :

- ◆ **La limace grise** (*Deroceras reticulatum*) : couleur rose violacé pour les jeunes, gris beige (plus ou moins foncé) pour les adultes. Sa taille adulte au repos est de 4 à 5 cm. Les dégâts sont majoritairement aériens.
- ◆ **La limace noire** (*Arion hortensis*) : couleur gris bleuâtre pour les jeunes, noire pour les adultes. Elle est plus petite que la limace grise : sa taille adulte au repos est de 2,5 à 4 cm. Les dégâts sont principalement souterrains.



Limace grise



Limace noire

# PROTEAGINEUX



Apprenez à différencier les principaux symptômes de maladies sur féverole et sur pois avec les 2 courtes vidéos ci-dessous (Agathe Penant, Terres Inovia) :




## • Féverole d'hiver

Les parcelles du réseau sont actuellement entre les stades **début de l'élongation de la tige principale et début floraison**. Hors réseau, la floraison est en cours sur un grand nombre de parcelles.


Les parcelles du réseau sont globalement saines. Du **botrytis** et du **mildiou** sont observés sur 1 parcelle.

Plusieurs symptômes peuvent actuellement être observés sur les féveroles. Hors réseau, du botrytis est observé.


**Reconnaître les symptômes sur féverole**



**Nécroses** (fréquemment observées en sortie hiver). Absence de points noirs (pycnidies) au centre.



CAPDL



**Tâches marron plus claires : BOTRYTIS**


**Fond noir foncé du au FROID**

Terres Inovia

**Botrytis** : petites taches marron chocolat, évoluant en nécroses



© CETIOM



**Rouille**

**Botrytis**

Terres Inovia



**Mildiou**

CAPDL

**Ascochyte** (anc. Anthracnose) : brûlures de cigarette, pourtour noir, centre clair avec présence de nombreuses ponctuations noires



## • Féverole d'hiver (suite)

Les symptômes de **botrytis** sont les plus présents sur les parcelles actuellement. Ils sont visibles principalement sur les feuilles les plus basses. Soyez vigilants avec le retour des pluies en fin de semaine pour éviter la progression de la maladie sur fleurs et gousses.

La **rouille** est favorisée par le temps actuel (humide la nuit et chaud en journée). La maladie n'est pas observée dans le réseau.

## • Pucerons noirs de la féverole

Hors réseau, des manchons de **pucerons noirs** sont observés en Vendée ainsi que des coccinelles adultes dans les colonies. Les conditions sont favorables aux pucerons mais aussi aux auxiliaires. Leur présence peut suffire à réguler les populations de pucerons.



Manchon de pucerons noirs  
de la féverole

## • Pois d'hiver

Les pois d'hiver approchent de la floraison ou sont en cours de floraison.

Des symptômes de **bactériose** sont signalés sur plusieurs parcelles hors réseau en Maine-et-Loire et Vendée.

## • Pucerons verts du pois

Hors réseau, les **pucerons** sont observés dans un grand nombre de situations.

### Période de risque

De début floraison à fin du stade limite d'avortement

### Seuil indicatif de risque

10 pucerons par plante

## • Protéagineux de printemps

Certains ravageurs sont à surveiller.

La parcelle de pois de printemps du réseau est au stade **1ère feuille étalée**.

## • Sitones

Des morsures de **sitones** sont observées sur la parcelle du réseau : en moyenne 1 morsure/feuille. Les signalements sont moins nombreux cette semaine. Les températures douces de la journée sont favorables à l'activité du ravageur. Le sitone est actif lorsque le temps est ensoleillé et que les températures dépassent les 12°C. **Observez vos parcelles.**



Les sitones provoquent des dégâts sur les feuilles et les racines. L'adulte attaque les feuilles : des encoches demi-circulaires sont alors visibles sur les bords. Les morsures n'ont pas d'impact sur le rendement mais indiquent la présence d'adultes qui vont pondre dans la parcelle.

Les larves consomment les nodosités du pois ainsi que les petites racines perturbant l'alimentation de la plante. Les attaques de larves peuvent avoir un impact sur le rendement variable suivant l'intensité de l'attaque.



## • Sitones (suite)

### Période de risque

De la levée au stade 6 feuilles. Au-delà de 6 feuilles, les adultes ont déjà pondu au pied des plantes.

### Seuil indicatif de risque

Pois : 5 à 10 morsures en moyenne par plante

Féverole : au moins 1 morsure sur chaque feuille



Sitone adulte



Morsures de Sitone

## • Thrips

Ce ravageur n'est pas observé dans le réseau.

Le **thrips adulte** est un minuscule insecte noirâtre de forme allongée (1-2mm). Les adultes passent l'hiver dans le sol et deviennent actifs dès 7-8°C.

Les températures actuelles sont suffisantes pour que les thrips soient actifs. Ils sont donc à surveiller dès la levée du pois.

C'est la salive toxique injectée par le thrips lorsqu'il se nourrit qui provoque différents symptômes

- Feuilles gaufrées avec des taches jaunes ou brunes
- Nombreuses ramifications
- Plantes chétives, naines, sans gousses



Les dégâts sont d'autant plus importants que la levée du pois est difficile (mauvaise conditions climatiques). Le thrips peut être présent sur féverole également. Cependant, sa nuisibilité n'a jamais été mise en évidence



Les thrips sont petits et difficiles à observer. **Pour les observer plus facilement**, prélever une dizaine de plantes au hasard dans la parcelle, les mettre dans un sachet plastique transparent. Le fermer et le placer au soleil. Après quelques minutes, les thrips sont visibles sur les parois du sac.

Il est aussi possible de les détecter en balayant la végétation avec une main mouillée.

### Période de risque

De la levée au stade 6 feuilles

### Seuil indicatif de risque

À partir d'1 thrips par plante. Prélever 20 plantes espacées les unes des autres au moins de quelques mètres. Les mettre dans un sac plastique transparent. Secouer. Attendre quelques minutes et compter le nombre de thrips présents sur les parois du sac. Diviser ce nombre par 20 pour obtenir le nombre moyen de thrips par plantes.



## • Auxiliaires prédateurs (ou parasitoïdes) de pucerons

Avec des températures plus douces ces dernières semaines, les pucerons sont observés sur les parcelles de céréales et de colza. Les auxiliaires sont aussi présents et actifs dès que les températures remontent. Le plus souvent ils suffisent à réguler les populations en particulier sur céréales à pailles.

On distingue :

- Les auxiliaires **prédateurs** : ils consomment les pucerons. Ce sont les coccinelles (adultes et larves), larves de syrphes, larves de chrysopes, cantharides adultes
- Les auxiliaires **parasitoïdes** : ils parasitent les pucerons. Les adultes de ces petites guêpes pondent dans les pucerons et leurs larves se développent en consommant l'intérieur du puceron. Leur action se traduit visuellement par la présence de pucerons momifiés (parfois un trou bien rond est visible sur la momie. C'est le signe que la larve a terminé son développement et qu'un nouvel adulte de parasitoïde est sorti du puceron).

Coccinelles :



Syrphes :



Chrysope :



Cantharide :



Puceron momifié :







Micro-hyménoptère















# ANNEXES















Graphes modèles septolis (Arvalis). Date de simulation : 20/04/2020

















Données météo : Météo France, prévisions Météo France jusqu'au 27-04-2020




Données météo : Météo France, prévisions Météo France jusqu'au 27-04-2020




Données météo : Météo France, prévisions Météo France jusqu'au 27-04-2020





Données météo : Météo France, prévisions Météo France jusqu'au 27-04-2020



Données météo : Météo France, prévisions Météo France jusqu'au 27-04-2020



Données météo : Météo France, prévisions Météo France jusqu'au 27-04-2020



# ACTUALITÉS




## • Les dernières publications Écophyto



Certaines substances actives sont solubles dans l'eau et peuvent être **régulièrement retrouvées dans les ressources en eaux de la région.**


Compte tenu des exigences en matière de qualité de l'eau, il est donc primordial de respecter les conditions d'emploi et recommandations d'utilisation des herbicides et, dans les zones les plus à risque de transferts, de mettre en place des méthodes alternatives.

Retrouvez sur ce document les alternatives possibles pour une des molécules herbicides utilisée dans notre région au printemps, avec notamment des liens vers des fiches et des vidéos sur les outils de désherbage mécanique ».



Retrouver les résultats de l'enquête menée auprès d'agriculteurs de la région dans le cadre du projet Alt'R glypho.

Consultez la fiche « **Couvert en interculture longue : choix des espèces et implantation** » en cliquant sur l'image.



Les curseurs de risque utilisés ont pour objectif de synthétiser l'ensemble des informations : observations, période de risque, données météo, modèles, ... sauf lorsque cela est précisé  
1 = risque faible; 2 = risque assez faible; 3 = risque moyen; 4 = risque assez fort; 5 = risque fort

