

## Colza : surveillez les tenthrèdes

### Tenthrède de la rave

Des larves de tenthrède ont été observées sur quelques parcelles de notre réseau. Elles consomment rapidement le limbe des feuilles, ne laissant que les nervures. Le colza y est sensible jusqu'au stade 6 feuilles.



Figure 1. A gauche : Colza semé le 21 août à RUILLE-LE-GRAVELAIS (stade 6 feuilles). A droite : photo d'une larve de tenthrède de la rave.

## Céréales : le labour, un outil puissant contre les graminées d'automne !

Il faut savoir que la majorité des graines d'adventices germent dans les 5 premiers centimètres du sol. En les enfouissant par le labour, celles-ci ne sont plus dans leur zone de germination et sont donc amenées à disparaître. Le labour, réalisé avant le semis de la céréale doit être fait tous les 3-4 ans afin de détruire les adventices qui ont un fort taux annuel de croissance, ce qui est le cas de la plupart des graminées à problème comme le ray-grass, le vulpin ou le brôme.

Cette technique, réalisée lentement, en terre bien ressuyée à 20-25 cm de profondeur, permet de réduire le stock semencier de 75 à 100% des principales graminées.




Figure 2: Effet du labour sur le stock semencier des graines adventices

Source : ACTA