


## Une croissance qui progresse lentement

- Contexte de pousse de l'herbe
- Fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage : quelles options ensuite ?
- Des fauches précoces possibles

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 20/03 au 27/03/2021	Hauteur moyenne (cm)	
<b>Zone Nord</b>	22	5,4	
<b>Zone Intermédiaire</b>	29	7,2	
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	26	7,5
	<b>Sud Loire</b>	29	8,1
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>27</b>	<b>7,4</b>	

Les conditions météo de la semaine passée (températures fraîches, vent d'Est et absence de précipitations) continuent de pénaliser la croissance de l'herbe qui reste inférieure aux normales saisonnières.



## Une pousse de l'herbe qui progresse timidement

La croissance moyenne de la région s'élève à 27kg MS/ha/j sur la semaine passée. C'est 5 kg de plus que la semaine précédente mais cela reste inférieur aux moyennes pour la saison. La semaine en cours est nettement plus douce, mais au regard des prévisions météorologiques annoncées cela ne devrait pas durer. De plus, dans l'hypothèse de l'absence de précipitations futures, le manque d'eau pourrait pénaliser la pousse à venir dans les parcelles les plus superficielles et séchantes. Alors que le 1<sup>er</sup> tour de pâturage se termine dans beaucoup d'exploitations, il est temps d'envisager les diverses options possibles pour la suite de la saison.

## Fin du 1<sup>er</sup> tour de pâturage : quelles options ensuite ?

Etant donné la faible croissance, il est important de ne pas trop raser les parcelles pour ne pas pénaliser davantage leur repousse. Pour cela il est nécessaire d'ajuster les complémentations (à l'auge ou au champs) et de veiller aux hauteurs d'herbe en sortie de parcelle. Dans le cas où les animaux n'ont plus de parcelles bonnes à pâturer dans le circuit de pâturage, plusieurs options peuvent être envisagées.

- Faire pâturer des surfaces de fauche. Cela permet de valoriser de l'herbe de qualité et sans frais de récolte. Cela permettra de décaler la fauche et ainsi de les étaler dans le temps. Des surfaces débrayées par la suite pourront venir compléter les stocks.


- Si aucune parcelle n'est pâturable, il est préférable de mettre les animaux sur une parcelle « parking » (parcelle qui passera en maïs par exemple) pour ne pas compromettre la pousse future de la campagne par du surpâturage (pâturage trop ras, et/ou temps de retour trop court).

Enfin, si le manque de fourrage se fait déjà craindre, d'autres options peuvent commencer à être envisagées : achats de fourrage, achat d'herbe sur pied, implantations d'espèces pour pâturage estival (sorgho multicoque, millet perlé, moha, trèfles, etc.).

## Des fauches précoces possibles

Le contexte météo actuel permet de bonnes conditions de préfanage. Certaines parcelles sont susceptibles de pouvoir être fauchées rapidement dans l'optique de récolter un fourrage de qualité. Les repousses peuvent être excellentes derrière et permettre d'autres récoltes.

Les rendements ne seront pas très élevés mais la qualité sera au rendez-vous. Cela peut également permettre de libérer rapidement des surfaces destinées aux cultures de printemps.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

**Chambre d'agriculture Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)

**SEENOVIA** 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)