


Retour de pousses basses

- Maintenir des hauteurs de sortie minimales
- Augmenter les temps de retour
- Adapter les surfaces en fauches et prochainement en maïs aux circonstances.

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 5/04 au 11/04/2021	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	27	6,0	
Zone Intermédiaire	26	7,8	
Zone Sud	Nord Loire	24	8,0
	Sud Loire	29	8,7
MOYENNE REGION	26	7,9	

La forte baisse des températures observée depuis la semaine dernière engendre une baisse de la pousse de l'herbe. Elle s'établit à **24 kg MS/ha/jour**, et repasse nettement en dessous de la moyenne pluriannuelle (**54 kg MS/ha/jour**). De plus, la présence de vents de Nord-Est va sans doute stabiliser cet état pendant plusieurs jours.



Maintenir des hauteurs d'herbe suffisantes pour les cycles suivants

Sur la plupart du réseau, et plus largement sur les prairies que nous voyons en ce moment, nous observons une **baisse des hauteurs de pâturage** sur ces derniers jours. Même si cette baisse est assez favorable à la gestion des espèces précoces (vulpins, dactyles), elle est clairement **défavorable à la reprise normale des croissances** de l'herbe.

Ceci est d'autant plus vrai dans des parcelles où le pâturage intensif a pu créer des zones fortement tassées, et dans les sols superficiels, plus sensibles aux conditions sèches de ce début de saison. Un certain nombre de parcelles de ce type ont enregistré des croissances nulles sur le réseau.

En vue de ces 15 prochains jours plutôt défavorables à la reprise de la pousse, il est d'autant plus important de maintenir des hauteurs d'herbe minimales de **5-6 cm en sortie de pâturage**, afin de ne pas pénaliser les cycles de repousse suivants. Pour cela, il convient de poursuivre, voire d'augmenter les apports à l'auge si la surface offerte n'est pas suffisante. En vue d'économiser du paillage, le pâturage de nuit est tout à fait possible, mais à privilégier sur des parcelles « parking » si la surface offerte est juste (moins de 30 ares/UGB pâturant).

Augmenter les temps de retour par rapport à l'habitude


Du fait de la faible pousse, et des faibles hauteurs du moment, il serait tentant de faire un deuxième (ou troisième) **tour de pâturage rapide** afin de valoriser au mieux la pousse de qualité du moment. C'est une mauvaise idée du point de vue de la productivité des prairies, car d'un cycle à l'autre, le temps de repousse se réduit, et les hauteurs d'herbe également. A titre d'exemple, il faut environ **25 jours à une prairie pour passer de 6 à 12 cm de hauteur**, dans des conditions de pousse normale pour la saison. Dans le contexte actuel, le temps nécessaire pour atteindre les mêmes conditions de pâturage est d'**environ 35 jours**, et il est préférable de les respecter pour l'instant.

Il est donc encore nécessaire soit de **poursuivre la complémentarité à l'auge**, soit de pâturer sur de grandes surfaces, en pâturant notamment des prairies en temps normal destinées à la fauche, au printemps puis réintégré au circuit de pâturage en été.

Adapter la conduite des surfaces de fauche et les prairies prochainement cassées aux circonstances

Afin de sécuriser l'implantation et le développement des maïs suivant une destruction de prairie, il est désormais **déconseillé de poursuivre le pâturage sur ces surfaces**. Réaliser une coupe de nettoyage avant l'implantation du maïs si besoin, puis n'attendez pas pour casser ces parcelles dans le but de préserver leur réserve hydrique.

Pour ce qui est des prairies mixtes, il est plus efficace, pour le moment, de **poursuivre le pâturage sur ces surfaces complémentaires**, plutôt que de faire des stocks précoces et de mettre en péril la surface exclusivement destinée au pâturage.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr