


## Le temps sec persiste, mais du changement se profile

- Maintenir la conduite et s'adapter à la météo
- Anticipez les stocks
- Semis sous couvert adapter la stratégie

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 10/04 au 16/04/2021	Hauteur moyenne (cm)	
<b>Zone Nord</b>	41	6,6	
<b>Zone Intermédiaire</b>	48	8,0	
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	34	8,3
	<b>Sud Loire</b>	39	9,9
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>39</b>	<b>8,5</b>	



*Rien ne bouge, les croissances stagnent et rien n'indique un redémarrage dans l'immédiat. La croissance est désormais à 30 kg en dessous de la moyenne pluriannuelle.*

*Un changement de temps se profile à l'horizon du weekend prochain, mais pour l'instant rien de formel. Un potentiel changement des flux qui passeraient d'Est en Ouest, et donc, potentiellement seraient plus favorables pour apporter des perturbations pluvieuses...*

## Maintenir la conduite et s'adapter à la météo

Pour l'instant rien ne change. Le tour de parcelle permet encore d'évaluer les stocks sur pied et d'adapter l'ordre des parcelles à faire pâturer. Il faut garder le cap et ne pas se laisser perturber avec ces potentielles précipitations. Il faut finir cette semaine de faucher ce qui était prévu. Les repousses seront meilleures sur une végétation jeune. Un apport d'azote malgré l'augmentation de prix est encore un levier possible sur les flores à majorité de graminées pour favoriser la reconstitution de stocks en tenant compte de ce qui n'a pas forcément été valorisé des apports précédents. L'idée est de stimuler la croissance de la prochaine coupe, uniquement si les conditions météo changent.

## Anticiper les stocks


Avec un démarrage incertain Il est donc important, après cette première salve de fauches, de **faire le bilan de ce qui a été récolté** et d'estimer les fauches à venir. En constatant ce qu'il manque on ajustera mieux la stratégie. Quelles solutions envisager ensuite: achat de fourrages, de paille, substitution d'un fourrage par un autre, implantation de couverts d'été/ automne, ajustement de cheptel...

Il est important de **connaître les besoins en fourrage de l'hiver prochain pour anticiper.**

## Prairies semées sous couvert : quelle stratégie ?

Les prairies semées sous couvert de céréales ou céréales-protéagineux à l'automne dernier offrent plusieurs possibilités pour s'adapter au contexte et aux besoins de stocks :

- Si vous avez besoin de **fourrage de qualité : récolter de manière précoce** pour assurer la qualité et permettre à la prairie de redémarrer rapidement ensuite. On fera un stock de haute valeur protéique. Fauche d'avril
- Si vous avez **besoin de volume : attendre avant de récolter une plus grosse biomasse**, certes de moindre valeur, mais avec de la quantité qui fera une ration pour des animaux à besoins plus modérés. Fauche en mai pour atteindre un volume plus conséquent
- La troisième **stratégie est intermédiaire** : elle consiste à faire **pâture une partie** de ces prairies semées sous couvert afin de **laisser le temps à la surface de prairie du circuit de pâturage habituel de refaire du stock**, tout en préservant le stock à distribuer. Si on l'avait récolté, il serait redistribué peu de temps après. On s'épargne des frais de mécanisation et du brassage de stocks. Attention : pâturage au fil obligatoire pour ne pas gaspiller !
- Et enfin la dernière solution est de **récolter en fourrage une partie des méteils qui étaient prévus en grain**. On refait du stock et la prairie devient accessible plus rapidement.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)

SEENOVIA 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)