


Les conditions redeviendront plus favorables à l'herbe

- Laisser le temps aux prairies de reconstituer des réserves
- Bien maîtriser les épis
- A défaut de quantité, la qualité est au rendez-vous

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 26/04 au 02/05/2021	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	42	6,8	
Zone Intermédiaire	52	8,3	
Zone Sud	Nord Loire	34	8,2
	Sud Loire	53	10,8
MOYENNE REGION	44	8,7	



La croissance moyenne relevée sur l'ensemble du réseau n'est qu'en très légère augmentation, du fait des conditions de vent, de précipitations et de températures défavorables.

La pousse moyenne s'établit à 44 kg MS/ha/j, ce qui représente à peine plus de la moitié de la normale depuis l'année 2000.

Cependant, le retour d'un front dépressionnaire et de températures plus clémentes sur ces prochains jours devraient enfin permettre d'inverser un peu la tendance.

Laisser le temps aux prairies de reconstituer des réserves

Bien que les jours à venir semblent être plutôt favorables à une reprise de croissance, il semble néanmoins encore **prématuré d'adopter une intensité de pâturage élevée**, juste après une fenêtre météo favorable. En effet, on peut s'attendre à ce que les prairies qui ont déjà bien souffert ces derniers temps ne soient **pas immédiatement en mesure de produire** suite au retour de précipitations et de températures plus douces.

De plus, il est préférable de mettre à profit ce créneau **pour laisser les prairies reprendre des hauteurs normales** (12 cm herbomètre en entrée), afin qu'elles soient de nouveau aptes à produire en fin de printemps, et qu'elles s'effondrent moins vite en conditions estivales.

Au sein du réseau, nous observons une différence nette entre des systèmes faisant, ou ayant fait le choix de réduire temporairement le pâturage, et ceux maintenant un pâturage assez intense. Les premiers enregistrent en ce moment des pousses honorables compte-tenu des conditions, et les seconds ont tendance à avoir des prairies qui s'épuisent.

Bien maîtriser les épis

Nous entrons dans une période où toutes les graminées prairiales de base (Ray-Grass, Fétuques, Dactyle, ...) entrent ou vont entrer en épiaison. Compte-tenu des stress qu'elles ont subi ces derniers temps, ces **montées à épi pourraient être conséquentes et rapides**.

Ainsi, il convient de rappeler quelques « règles » pour la bonne gestion des épis :


- Pour des prairies **entre 12 et 15 cm de hauteur**, il est encore possible de les valoriser correctement au **pâturage au fil**, c'est-à-dire sans générer de gaspillage ni de pertes de performances massive des animaux.
- Entre **15 et 18 cm**, il est encore possible de valoriser ces prairies au pâturage au fil également, mais avec des animaux à **faibles besoins** (génisses, vaches gestantes ou tarées, ...). Pour des animaux en lactation ou en engraissement, il sera préférable d'avoir recours à la **fauche**. Le **topping** est envisageable s'il n'y a pas une grande quantité d'épis sortis, car les moindres valeurs alimentaires seront compensées par une hausse de l'ingestion par rapport au pâturage.
- **Au-delà de ces hauteurs**, la fauche devient obligatoire pour éviter les gaspillages. Elle est de même plutôt intéressante du point de vue économique au vue du volume.

A défaut de quantité, la qualité est au rendez-vous

Des premiers retours que nous avons sur le pâturage et sur les premières fauches, le volume valorisé est largement en deçà des normales à la même date, à savoir autour de **1 à 1,5 t MS**.

Cependant, la pousse modérée a permis, et permet encore de valoriser une herbe feuillue, et donc de **bonne valeur alimentaire**. Les performances animales sont au rendez-vous (Lait, GMQ, taux, ...), et les problèmes métaboliques ont été extrêmement rares (tétanies, météorisation, entérotoxémie, ...).

Pour ce qui est des premières fauches, elles ont donné lieu à des chantiers de récolte se faisant dans de très bonnes conditions, ce qui est plutôt prometteur quant aux valeurs des fourrages. Seul le froid nous fait craindre ponctuellement un **léger déficit en protéines** pour les prairies à graminées dominantes.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr