


La météo évolue, on attend les bénéfices...

- Anticiper les débrayages
- Adapter la qualité des prairies aux besoins des animaux

		Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 03/05 au 09/05/2021	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord		38	7,3
Zone Intermédiaire		43	8,7
Zone Sud	Nord Loire	34	8,8
	Sud Loire	50	10,3
MOYENNE REGION		41	9,1



La croissance de l'herbe se stabilise à 41kg MS/ha/j en moyenne sur la région. Les bénéfices des précipitations de la semaine dernière devraient se faire ressentir cette semaine. Le flux est passé de l'est à l'ouest, les conditions perturbées devraient donc durer les prochains jours et contribuer à amplifier les premiers effets bénéfiques. Cependant les cumuls de précipitations commencent à être hétérogène avec les premiers orages.

Les mesures peuvent être surestimées dans certains cas à cause de trop nombreux épis

Anticiper les débrayages

Dans les exploitations qui ont préservé leurs prairies en gardant des hauteurs sorties et un temps de repousse suffisants, on commence à observer un redémarrage assez franc de la pousse, notamment dans le Sud de la région. Cette reprise va entraîner des débrayages à faire assez rapidement dans certains cas. Considérons une pousse à venir pour les 8 prochains jours à 50 kgMS/ha/j (remontée des températures minimales) et 35 ares disponibles par vache laitière, la quantité d'herbe offerte est de 18 kg MS/UGB/j (cf : tableau ci-dessous). La pousse satisfait donc les besoins journaliers du cheptel. Si le souhait est de maintenir une complémentation à l'auge à hauteur de 5 kgMS/VL/j, dans ce cas 13 kgMS/VL/j de pâturage suffisent, la surface pâturée peut donc être réduite à 25 ares/VL ce qui permet de débrayer 10 ares/VL dès maintenant (= 7 hectares pour un troupeau de 70 VL). Pour garder de la souplesse et de la sécurité il est préférable de faire cela en plusieurs chantiers décalés.

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
20	3	4	5	6	7	8	10	12
30	5	6	8	9	11	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24
50	8	10	13	15	18	20	25	30
60	9	12	15	18	21	24	30	36
70	11	14	18	21	25	28	35	42


Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Débrayer en priorité les parcelles mal pâturées lors des tours précédents et/ou celles qui montent à épis (fétuques, dactyle, et autres graminées précoces) et qui ont les hauteurs d'herbe les plus importantes. Ces parcelles pourront être fauchées dès qu'une fenêtre météo le permettra pour espérer profiter des conditions favorables à la repousse et ainsi les réintégrer au circuit de pâturage au mois de juin.

Si ce n'est déjà fait, nous sommes dans les derniers moments où il est justifié de fermer le silo (au moins pour le Sud de la région dans les conditions habituelles). La fermeture est possible au-delà de 20 kg MS/UGB/jour disponible (**chiffres en vert dans le tableau**).

Adapter la qualité des prairies aux besoins des animaux

La flore évolue rapidement à cette période, on observe des épiaisons rapides des espèces les plus précoces. Cela entraîne une baisse de la qualité des parcelles concernées. Il est donc important d'accorder la qualité de l'herbe aux exigences de production des animaux. Privilégier les parcelles encore bien feuillues aux animaux à forts besoins (vaches en lactation, mères suitée, animaux en croissance ou engraissement...).



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr