

Météo : une évolution enfin favorable à la croissance de l'herbe


- Anticiper les débrayages
- Faire le point sur les stocks pâturables
- Abaisser les apports à l'auge

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 10/05 au 16/05/2021	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	43	6,3
Zone Intermédiaire	52	8,4
Zone Sud		
Nord Loire	42	9,5
Sud Loire	49	11,1
MOYENNE REGION	47	9,6

Proche de 50 kg/ha/jour en moyenne, la croissance continue sa remontée, mais reste encore en deçà des normales.

Le retour d'une douceur des températures et surtout des précipitations, vont apporter un soutien non négligeable à la croissance de l'herbe. Ce sont surtout les sols avec une faible RFU* qui ont été les plus pénalisés (déficit hydrique très marqué). La croissance moyenne de la semaine passée témoigne de cette embellie qui, devrait se confirmer pour les 15 derniers jours de mai.

*Réserve Facilement Utilisable



Anticiper les débrayages

Beaucoup de parcelles ont des hauteurs d'herbe importantes dans le circuit de pâturage, liées aux refus, aux montaisons (RGA Tardif) et épiaisons (Dactyle, Fétuque élevée, pâturin commun). Ces parcelles sont à réserver à la fauche (coupe récoltable en topping *), lorsque les conditions de séchage seront bonnes. Cette fauche, permettra de préparer au mieux le dernier cycle de pâturage printanier. Avec le retour de bonnes conditions de croissance, on peut espérer un retour 25 jours après fauche (6 cm à pâturer)

La qualité du prochain cycle s'anticipe. Les parcelles riches en légumineuses (en particulier le Trèfle blanc, pourraient aussi bénéficier des amendements fertilisants organiques épandues en sortie d'hiver et qui n'ont pas été complètement valorisés.

*Topping : action mécanique qui consiste à faucher une parcelle avec une hauteur importante (>17 cm) souvent épiée, du circuit de pâturage pour faire consommer directement au champ après un séchage au sol de 12 heures (pré fanage)

Faire le point sur le stock pâturable

Nous vous invitons à calculer le nombre de jours d'avance prévisionnels au pâturage et vous reporter dans le tableau. (Regardez pour cela la surface accessible de votre lot, ainsi que la hauteur moyenne du circuit de pâturage).

Avec les perspectives d'une météo clémente, les élevages avec plus de 30 ares par vache vont pouvoir assurer un menu de pâturage seul pour les semaines à venir si les hauteurs du circuit de pâturage avoisinent les 9 cm.


Nombre de jours d'avance en ration 100% herbe selon la hauteur moyenne des parcelles

(considérant qu'1 UGB consomme 17 kg MS/jour)

Hauteur moyenne de l'ensemble des parcelles (cm)	ares disponibles /UGB					
	15	20	25	30	40	50
7	4	6	7	9	12	14
8	6	9	11	13	17	22
9	9	12	14	17	23	29
10	11	14	18	22	29	36
12	15	20	25	30	40	50
14	19	26	32	39	52	65

Diminuer la ration à l'auge, augmenter la part de pâturage

Une semaine poussante s'annonce. Les croissances à venir vont donc pouvoir satisfaire les besoins des animaux en pâture. On observe des hauteurs moyennes et jours d'avance assez importants dans les parcelles du réseau. Il est préconisé de faire consommer ces parcelles rapidement avec un pâturage intensif de façon à bénéficier d'une repousse intéressante pour le dernier cycle de printemps. Les parcelles riches en Trèfle blanc (>30-40 %) seront, quant à elles, plus à même à constituer des stocks sur pied en début d'été.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr