


La croissance progresse, mais est toujours en-dessous de la moyenne régionale

- Météo clémente pour les fauches cette semaine
- Augmenter la pression au pâturage pour bien valoriser l'herbe
- Gérer les vivaces : les chardons communs sont en fleur

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 17/05 au 24/05/2021	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	68	9,2	
Zone Intermédiaire	58	9,2	
Zone Sud	Nord Loire	56	10,2
	Sud Loire	48	10,9
MOYENNE REGION	56	10,0	

La croissance augmente pour passer la barre des 50 kg MS/ha/jour cette semaine. Elle reste en-dessous de la moyenne régionale. Ce sont désormais les températures fraîches qui limitent la croissance. La remontée des températures qui est annoncée devrait permettre de rattraper la moyenne dans les semaines à venir.



Météo clémente pour les fauches cette semaine

Le temps sec arrive cette semaine et va permettre de faucher dans de bonnes conditions. Le sol est cependant humide. Attention aux parcelles riches en trèfle car le séchage sera lent. Dans ce cas, privilégier une exploitation en pâturage ou un enrubannage. Dans tous les cas, il est recommandé de faucher haut, à 6-7 cm herbomètre.

Dans les parcelles avec beaucoup d'épis et peu de légumineuses, privilégier le foin, moins coûteux pour un fourrage qui a perdu en valeur avec l'avancement du stade.

Augmenter la pression au pâturage pour bien valoriser l'herbe

Même si le temps est propice aux fauches, attention à ne pas faucher trop grand pour ne pas se retrouver à court de pâturage dans quelques semaines : garder 12 à 15 jours d'avance en lait et 15-20 jours d'avance en élevage allaitant. Pour valoriser les parcelles un peu avancées au pâturage, il est nécessaire de réduire la surface offerte pour limiter le tri avec un fil avant ou de petits paddocks.

Valoriser au pâturage les parcelles les plus tardives ou riches en légumineuses qui sont plus difficiles à faire sécher. Les parcelles les plus épiées seront mieux valorisées en fauche. Les parcelles fauchées cette semaine pourront être à nouveau pâturées fin juin.

Dans les parcelles les plus tardives qui ne sont pas encore épiées, on peut sectionner l'épi par le pâturage en visant une hauteur sortie assez sévère à 5 cm. Si la hauteur entrée est élevée (mi-botte), il faudra utiliser un fil avant pour réussir à faire insister les animaux.

Gérer les vivaces : les chardons communs sont en fleur



Chardon commun en bouton
(Source : Seenovia)




Chardon des champs au stade végétatif (Source : Seenovia)

C'est le bon moment pour faucher les chardons communs qui sont en fleur. Ce sont des plantes bisannuelles de grande taille. S'ils sont coupés avant la formation des graines, ils ne repartiront pas car ils se seront épuisés à produire leur hampe florale, le tour est joué.

Les chardons des champs fleurissent plus tard, vers la fin juin. Il est trop tôt pour faucher ces chardons vivaces. Les couper avant la formation de la hampe florale stimule leur croissance, ils créent alors de nouveaux bourgeons sur la racine souterraine.

Les rumex arrivent quant à eux au stade floraison, il est temps de les couper, sauf dans le Nord de la région, ou dans les secteurs plus tardifs.

Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr