


Ça chauffe ! Ça fauche ?

- Enfin des températures élevées.
- Désormais, comment gérer les parcelles du circuit de pâturage ?

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 25/05 au 31/05/2021	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	45	8,0	
Zone Intermédiaire	56	10,0	
Zone Sud	Nord Loire	57	10,4
	Sud Loire	44	10,5
MOYENNE REGION	52	10,0	

Pour la 2^{ème} semaine consécutive, la croissance dépasse les 50 kg MS/ha/jour en moyenne de région. Elle marque cependant le pas en Zone Sud Loire et en Zone Nord. Où, à priori, il y a aussi eu moins de fauche sur les derniers jours de mai.

Les principales raisons de ce « retard » sont soit que les hauteurs d'herbe étaient insuffisantes, ou en raison de sols trop engorgés suite à des pluviométries importantes.



Enfin des températures élevées, mais voilà les orages.

Les pluies du mois de mai étaient certes bénéfiques, mais la chaleur faisait toujours défaut. Il a fallu attendre les derniers jours de mai pour voir le ciel se dégager et les températures maximales dépasser les 20°C. Situation bénéfique pour la pousse et pour envisager à nouveau des fauches alors que les hauteurs d'herbe augmentaient significativement avec les montaisons-épiaisons des graminées.

Mais voilà que les orages stoppent la dynamique de fauche au combien intéressante à cette époque de l'année, car le sectionnement des épis permet d'assurer une repousse en volume et en qualité. Le rendement sur des parcelles en 1^{ère} coupe, évoluera très peu maintenant, aussi les fauches sont à envisager au plus vite pour bénéficier en repousses de l'humidité des sols et des températures. Après les orages, il faudra donc profiter au plus vite de la météo pour envisager préférentiellement des foin. Même si le besoin de stock se fait sentir, ne fauchez pas en dessous de 6-7 cm car vous pénaliserez le redémarrage de la végétation.

Désormais, Comment gérer les parcelles du circuit de pâturage ?


En ce début juin, suivant la catégorie de prairies présentes dans le circuit de pâturage et les surfaces offertes pour chaque lot, voilà les priorités à venir.

Les élevages intensifs avec peu de surfaces accessibles ont des parcelles de catégories 1 et 2. Les plus herbagers ont différentes catégories dont la type 5 et des temps de retour plus longs favorisant le volume produit dans les prochaines semaines.

	1 ^{ère} semaine de juin	2 ^{ème} semaine de juin	3 ^{ème} semaine de juin	4 ^{ème} semaine de juin	Fin juin - début juillet	5- 10 juillet	mi-juillet	20- 25 juillet
1	Parcelles toujours pâturées avec RGA à épiaison tardive. Paturage associé si besoin à topping ou fauche de refus.					Retour à nouveau en paturage si pas de catégories 5, si surface limitée ou si pousse faible en juin		
2	Parcelles fauchées fin avril-début mai, épis + ou – maîtrisés. Paturage associé si besoin à topping ou fauche de refus.					Retour à nouveau en paturage si pas de catégories 5, si surface limitée ou si pousse faible en juin		
3			Parcelles fauchées fin mai, graminées pures. Paturage stade feuillu					
4				Parcelles fauchées fin mai, graminées+ légumineuses en sol séchant. Paturage stade feuillu (TB ++)				
5						Parcelles fauchées fin mai, graminées+ légumineuses en sol profond. On constitue un STOCK sur PIED. Paturage stade feuillu (TB +++)		

En allaitantes, on réservera les repousses feuillues aux vaches suitées et les parcelles plus avancées en stade aux vaches ou génisses pleines en gérant l'offre au fil avant afin ne pas gaspiller l'offre actuelle.

Courbe de pousse, un pic faible et tardif



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr