


## Coup de chaud après le pic de pousse

- Baisse globale de pousse et gestion de l'herbe
- Précautions dans le stockage du foin

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 08/06 au 14/06/2021	Hauteur moyenne (cm)	
<b>Zone Nord</b>	87	9,5	
<b>Zone Intermédiaire</b>	57	11	
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	40	9,1
	<b>Sud Loire</b>	44	10,1
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>50</b>	<b>9,9</b>	



Après avoir atteint le pic de pousse de l'année la semaine dernière, le coup de chaleur vient ralentir la croissance de l'herbe (50 kgMS/ha/j de moyenne) avec un gradient nord sud assez marqué (voir tableau ci-dessus). Les pluies orageuses annoncées pour la fin de semaine pourraient accentuer les disparités de croissance. Malgré des orages les perspectives de croissance risquent d'être limitées à cette époque.

## Baisse globale de pousse et gestion de l'herbe

Les fortes chaleurs viennent nettement ralentir la pousse depuis la fin de semaine dernière. Les conditions de pâturage se compliquent mais le créneau a permis de réaliser de nombreux chantiers de fauche en bonnes conditions. Il va maintenant falloir adapter sa stratégie pour essayer de profiter du pâturage le plus longtemps possible. En effet en passant sous la barre des 50 kgMS/ha/j, beaucoup d'exploitations vont devoir compléter les animaux à l'auge de façon plus importante ou agrandir le circuit de pâturage pour répondre aux besoins du troupeau en terme de quantité (voir quantité d'herbe offerte en fonction de la surface disponible dans le tableau ci-dessous). D'autant plus que l'on peut s'attendre à une chute drastique de la pousse liée aux fortes températures depuis le weekend dernier.

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
20	3	4	5	6	7	8	10	12
30	5	6	8	9	11	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24
50	8	10	13	15	18	20	25	30
60	9	12	15	18	21	24	30	36
70	11	14	18	21	25	28	35	42

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Il faut anticiper un temps de repousse plus long à cette période (au moins 45 j) pour ne pas fatiguer les prairies et éventuellement pouvoir profiter d'une repousse.


On observe de nettes différences dans les qualités d'herbe à cette époque, les parcelles riches en trèfle, notamment, sont généralement plus fournies et leur valeur nutritionnelle est plus élevée et stable dans le temps. Ces parcelles sont à réserver à des animaux à fort besoin de production. Il faut veiller aux éventuelles transitions lors des changements de parcelles principalement pour les animaux en 100 % pâturage (exemple : passage d'une parcelle en graminée pure épiée vers une repousse de trèfle).

Pour les vaches laitières, il peut être préférable dans des conditions très chaudes de faire pâturer les animaux la nuit et/ou le matin, surtout si les zones d'ombre sont rares. De même l'accès à l'eau à moins de 150m est indispensable pour que les animaux continuent à pâturer et à produire.

Dans le cas où la surface de pâturage est limitée et que l'herbe vient à manquer, il faut avoir d'ores et déjà choisi des parcelles parking pour éviter de sacrifier la surface pâturable.

## Précautions à prendre dans le stockage du foin

Beaucoup de chantiers de foin ont été réalisés la semaine dernière et ont parfois permis de constituer du stock de qualité par des fauches au stade feuillu. Vigilance tout de même, ces fourrages sont plus difficiles à sécher. Il est donc préférable de rassembler les bottes tout en les laissant en extérieur au moins une quinzaine de jours.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

**Chambre d'agriculture Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)

**SEENOVIA** 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)