


Les nuages et les températures limitent la pousse

- Des hauteurs trop faibles
- Conditions favorables aux semis après la moisson

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 22/06 au 28/06/2021	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	49	8,2	
Zone Intermédiaire	46	9,4	
Zone Sud	Nord Loire	39	8,8
	Sud Loire	36	8,9
MOYENNE REGION	41	8,9	

Avec une moyenne régionale de 41 kg MS/ha/jour, la pousse remonte un peu, mais reste en deçà des prévisions. En effet, les nombreuses précipitations en ce mois de juin pouvaient nous faire espérer une pousse supérieure. La couverture nuageuse et les températures inférieures à 20°C en journée ont limité les bienfaits des pluies. Et il faudra attendre quelques jours en juillet pour retrouver de la chaleur.



5 cm



10 cm



15 cm

Des hauteurs trop faibles

La hauteur moyenne des parcelles mesurées dans le réseau la semaine dernière est de 8.9 cm. C'est relativement bas contenu du fait que les sols ne souffrent plus pour le moment de déficit hydrique. Certes **la pousse est moins élevée que prévue, mais nous constatons aussi que dans beaucoup de cas, les animaux entrent dans des parcelles à moins de 10 cm herbomètre.**

Alors que dans la plupart des prairies les épis de graminées ont été maîtrisés par la fauche, on peut désormais miser sur des repousses feuillues et profiter de l'apport du trèfle blanc. Il semble que ce ne soit pas le cas dans beaucoup d'élevages où le stock d'herbe sur pied est plus faible qu'on ne le pense. Il convient donc de remonter la ration à l'auge ou dans les râteliers afin de laisser les prairies reprendre du volume avant l'entrée des animaux. Certaines d'entre elles ont souffert ce printemps, avec notamment des hauteurs sorties basses, il faut leur laisser le temps de se refaire.

A la saison, les temps de retour sur parcelle doivent être augmentés pour prolonger la saison de pâturage. 6 jours de plus avec une croissance de 40 kgMS/ha/jour c'est 240 kgs de MS /ha en entrée de parcelle, soit 1 cm de hauteur en plus.

Le tour de parcelles est toujours d'actualité, tout d'abord pour repérer les parcelles qui repoussent moins vite, celles présentant des graminées à ré-épiaison qui devront être récoltées en enrubannage

en fin de semaine car pour le foin, il faudra attendre la semaine suivante. Regarder aussi la présence de plantes indésirables telles que les crépides (photos) et les picrides qui sont en montaison et peuvent encore être consommées, ce ne sera plus le cas quand la chaleur reviendra.




Les crépides et picrides sont en montaison

Une année favorable pour des semis de dérobées sitôt la moisson

L'humidité des sols offre une opportunité cette année pour envisager des semis RGI, colzas ou sorghos multicoups aussitôt après la moisson notamment dans les élevages avec peu de stocks. Même si nous savons qu'il s'agit d'une prise de risque, la réflexion doit porter sur l'utilisation qu'on en fera, paturage, ensilage, enrubannage et pour quels animaux sans oublier la période de valorisation et l'impact sur la rotation.

Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr