

Dernier bulletin avant la reprise de l'automne

- Plus de 50 kgMS/ha/jour mi-juillet, c'est exceptionnel !
- Trop d'herbe en juillet ? Faucher ou rationner
- Le trèfle marque maintenant la différence
- Bilan d'un printemps atypique : déficit moyen de 800 kgMS/ha d'herbe sur la région

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 2 au 9/07/2021	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	40	8,2	
Zone Intermédiaire	52	10,3	
Zone Sud	Nord Loire	50	10,1
	Sud Loire	66	10,6
MOYENNE REGION	54	10,1	



La croissance mesurée entre le 2 et le 9 juillet se maintient avec une tendance à la hausse en zone Sud et une légère baisse dans les zones Nord et Intermédiaire par rapport à la semaine dernière.

On dépasse les 50 kg MS/ha/jour mi-juillet, c'est exceptionnel ! Avec des températures qui augmentent et des orages annoncés dans 10 jours, on s'attend à un maintien de ce niveau de croissance jusqu'au 25 juillet.

Trop d'herbe en juillet ? Faucher ou rationner !

Une nouvelle vague de fauches est en cours. Pour savoir quelle surface faucher, vous pouvez calculer les jours d'avance au pâturage. A la saison, conserver 20 jours d'avance en lait et 25 jours en viande.

Sur les parcelles avec beaucoup d'herbe sur pied (> 14 cm herbomètre), limiter la surface accessible au pâturage avec un fil avant. Dans les parcelles avec du ray-grass hybride ou du ray-grass anglais précoce qui sont remontants (plusieurs épis au printemps), on peut encore utiliser le topping pour limiter le tri : faucher haut 1 jour avant de faire pâturer les animaux.

Malgré la pousse actuelle, **prévoyez pour les lots qui ne rentreront pas en bâtiment cet été vos parcelles parking pour les affourager quand la croissance va ralentir.** C'est primordial pour conserver le potentiel de vos autres prairies et assurer une bonne repousse d'automne.

Le trèfle marque maintenant la différence

Les parcelles riches en trèfle sont favorisées par la météo : leur croissance se prolonge avec une meilleure qualité d'herbe. **Conserver des temps de repos longs** (minimum 30 jours) entre deux pâturages le favorise car il a un cycle plus long que la plupart des graminées. La croissance des ray-grass va ralentir avec la hausse des températures, tandis que les fétuques, dactyles et trèfles devraient se maintenir.

Fauchez les zones où les picris sont abondants pour limiter leur développement. Ces plantes à pivot racinaire et à fleurs jaunes sont peu appétentes ; elles se développent depuis plusieurs années.

Dernier bulletin du printemps : bilan d'un printemps atypique

Le cumul de pousse calculé ce printemps dans le réseau de croissance de l'herbe Pays de la Loire indique un **déficit moyen de 800 kg MS/ha d'herbe au printemps 2021** par rapport à notre moyenne 2000-2020. Sur le réseau on obtient en moyenne 5,3 TMS d'herbe produite/ha au printemps 2021 jusqu'au 9 juillet, contre 6.2 TMS/ha en moyenne de 2000 à 2020 (cf. courbe). **Cependant l'herbe n'a pas dit son dernier mot cet été, et la croissance devrait se maintenir à 50 kg MS/ha/jour jusqu'au 25 juillet, permettant de prolonger le pâturage jusqu'à fin juillet/début août dans la majorité des fermes de la région.**


Après un démarrage de la pousse ralenti par le froid et le vent d'Est, le manque d'eau s'est fait ressentir dans les terrains les plus séchant. On a observé dès le mois d'avril de l'herbe jaunissant à cause du manque d'eau. Il n'y a pas eu de pic de croissance cette année. Par contre, le pâturage en conditions sèches sur des hauteurs plus faibles qu'à l'accoutumée a permis une bonne valorisation.

Les premières récoltes (ensilages, enrubannages) ont bénéficié d'un beau créneau météo, avec des récoltes de qualité mais des quantités limitées. Les mois de mai et juin ont été en revanche bien arrosés. La croissance n'a pourtant pas explosé en fin de printemps en raison d'un manque d'ensoleillement et de chaleur, mais elle a progressé jusqu'à dépasser la courbe moyenne fin mai.

Des fauches sont en cours pour des 2èmes ou 3èmes coupes. Les volumes d'herbe stockée non réalisés au printemps vont être en partie compensés par ces récoltes tardives, et surtout par la prolongation du pâturage cet été. Les pluies régulières maintiennent la croissance à un niveau exceptionnellement haut depuis la mi-mai. Alors que certaines régions du monde ou d'Europe subissent canicules ou inondations, **nous bénéficions d'un été normand en Pays de la Loire : profitons-en !**



Nous allons autant que possible prolonger les mesures cet été pour suivre la croissance. Rendez-vous le 8 septembre pour le 1^{er} bulletin de l'automne. Bel été à tous !



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr