


Gestion d'entrée d'hiver

- Attention à la portance des sols
- Surveiller les chemins qui se dégradent, et les entrées-sorties de parcelles
- Adapter le chargement à la parcelle (portance)

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 19/10 au 2/11/2021	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	19	6,9	
Zone Intermédiaire	13	7,4	
Zone Sud	Nord Loire	19	7,2
	Sud Loire	19	7,7
MOYENNE REGION	18	7,4	

La croissance de l'herbe mesurée entre le 19 octobre et le 2 novembre est de 18 kg MS/ha/jour. Elle est relativement stable et fidèle aux moyenne de saison



Continuer ou rentrer les animaux ? Telle est la question !

La croissance de ces dernières semaines a permis une pousse correcte pour la saison et certaines parcelles sont aujourd'hui assez hautes dans les fermes de la région (>7cm herbomètre). Avec le cumul de précipitations d'octobre, la portance des sols est un facteur limitant pour le pâturage. Plusieurs cas de figures peuvent se présenter :

Les parcelles pâturées récemment et dont la hauteur d'herbe se situe en dessous de 6 cm herbomètre n'ont pas à être pâturées avant l'hiver.

Les parcelles supérieures à 7 cm herbomètre doivent être pâturées pour éviter une accumulation de feuilles sénescentes cet hiver afin de ne pas pénaliser le développement d'une herbe de qualité et appétente au début du printemps.

Une attention particulière sera apportée aux chemins : les boiteries qui se développent à cette période de l'année sont souvent dues à des cailloux ou corps étrangers présents sur les chemins qui se dégradent. Lorsque cela est possible, réaliser une entrée et une sortie de parcelle.


Diminution du chargement

- Le maintien de lots importants ou de gros animaux vont détériorer les parcelles les moins portantes. Si les conditions de portance ne sont pas optimales, il est préférable de continuer avec un ou plusieurs lots de génisses (baisse du chargement instantané à la parcelle). Attention toutefois aux génisses qui sont à la veille de leur période de reproduction ; l'herbe d'automne est riche en azote soluble.
- Il est possible de réduire le temps de présence des gros lots sur la parcelle. Quelques heures suffisent pour que des vaches ingèrent jusqu'à 1/4 à 1/3 de leur ration journalière..
- Augmenter la surface accessible en ouvrant plusieurs parcelles limitera le piétinement dans les parcelles à portance limitée.

Conduite différente en fonction de l'âge de la prairie

Une jeune prairie de 1 ou 2 ans d'implantation est plus fragile (sol moins stable, moins portant). Il est préférable d'attendre des conditions de ressuyage avant de rentrer des animaux.

A l'inverse, des prairies destinées à être retournées pour une implantation de culture de printemps peuvent être valorisées tard.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr