


Une bonne dynamique de pousse

- S'adapter au pic de pousse à venir.
- Plus d'herbe en entrée de parcelle.
- Trèfle et flore favorables à une bonne valorisation.

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 09 au 15/04	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	64	8,8	
Zone Intermédiaire	44	8,9	
Zone Sud	Nord Loire	56	9,3
	Sud Loire	56	10,3
MOYENNE REGION	54	9,6	



Après une chute due aux gelées, et grâce aux pluies qui ont suivi, la croissance de l'herbe a repris un rythme proche des moyennes pluriannuelles (cf. courbe). Cette dynamique devrait se poursuivre dans les semaines à venir.

S'adapter au pic de pousse à venir

Même s'il convient d'être toujours prudent, notamment sur les terres à faible réserve hydrique, les conditions météo actuelles sont favorables au pic de croissance habituel, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier. L'arrivée de pluies pour ce week-end devrait favoriser cette croissance.


Nous arrivons dans la période où la pousse est la plus élevée, autrement dit : les surfaces pâturées vont être réduite au minimum pour dégager des parcelles en vue de la constitution de stocks. Les retours sur parcelle seront plus courts, l'alimentation à l'auge réduite et tous les animaux susceptibles de pâturer seront à l'extérieur. Néanmoins, il convient d'être prudent dans les élevages où le chassé-croisé entre parcelles destinées au maïs et parcelles de 1^{ère} année en attente de fauche réduisent trop la surface et limitent temporairement le nombre de jours d'avance en herbe pâturée.

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
40	6	8	10	12	14	16	20	24
45	7	9	11	14	16	18	22,5	27
50	8	10	13	15	18	20	25	30
55	8	11	14	17	19	22	27,5	33
60	9	12	15	18	21	24	30	36
65	10	13	16	20	23	26	32,5	39

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Plus d'herbe en entrée de parcelle

Les hauteurs mesurées la semaine dernière (9.6 cm en moyenne, cf. graphique) traduisent aussi le potentiel et montrent que la situation était beaucoup plus tendue en 2021 du fait que mars et avril étaient très secs. Cette différence représente 425 kgs de MS de plus à l'ha entre 2022 et 2021. Restons prudent cependant car ce début d'année 2022 est aussi très peu pluvieux.




Les hauteurs moyennes sont une chose, encore faut-il bien exploiter cette masse végétale. Les hauteurs entrées augmentent, mais il faut maintenir des hauteurs sorties à 4-5 cm herbomètre tout en limitant les refus avant le prochain cycle qui verra les graminées entrer en montaison dont en 1^{er} lieu les fétuques et dactyles.

Trèfle et flore favorables à une bonne valorisation

Le trèfle blanc est actuellement bien présent. L'absence d'excès d'eau hivernal, des stolons non piétinés favorisent sa présence. C'est un gage de valeur alimentaire, de potentiel fertilisant (pour un rendement annuel de 8 TMS 20% de TB au printemps et 40 % en été apportent 75 unités d'azote). Ce sera aussi un atout pour constituer des stocks sur pied si les conditions de début d'été sont favorables.

En prairie multi espèces, la flore est bien diversifiée sans espèce dominante. Le pâturage ras du pâturin commun en 1^{er} et 2^{ème} cycle limitera ses inconvénients lorsqu'il épiera.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr