


Fort ralentissement de la pousse

- Adapter les lots d'animaux à la qualité de l'herbe au pâturage
- Le topping : une solution d'opportunité pour limiter le tri
- Profiter du temps sec pour faucher

| | Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 29/04 au 06/05 | Hauteur moyenne (cm) |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Zone Nord | 59 | 10,6 |
| Zone Intermédiaire | 52 | 10,4 |
| Zone Sud | Nord Loire | 50 |
| | Sud Loire | 51 |
| MOYENNE REGION | 51 | 10,9 |

Le niveau de pousse a régressé avec le temps sec de ces dernières semaines et continuera de baisser avec l'absence de précipitations et des températures à plus de 20°C en journée. L'objectif du moment est donc de gérer les épiaisons pour ne pas perdre d'herbe pour les cycles à venir.



Adapter les lots d'animaux à la qualité de l'herbe au pâturage

En raison du déficit pluviométrique, la pousse de l'herbe chute, à l'exception des zones hydromorphes où elle se maintient. Le nombre de jours d'avance au pâturage va se réduire, les parcelles récemment fauchées ou pâturées vont repartir plus lentement. Les exploitations qui ont beaucoup fauché récemment peuvent se retrouver à court d'herbe dans les semaines à venir :

- Si la surface accessible le permet, on peut augmenter le circuit de pâturage avec les parcelles fauchées précocement.
- Une augmentation des quantités de fourrage à l'auge peut être à prévoir pour les troupeaux de vaches laitières, afin de maintenir le niveau de production.

La qualité des prairies risque de se dégrader avec les épiaisons. La fétuque et le dactyle montent en épis. Ainsi, il semble opportun de pâturer au fil avec des lots à faibles besoins, pour limiter les refus.

Les ray-grass anglais tardifs et la fléole entreront en épiaison dans 2 à 3 semaines, leur exploitation en pâturage est plus simple actuellement.

Prioriser les parcelles peu avancées encore feuillues et de qualité pour les lots les plus exigeants d'un point de vue des besoins. Pour les parcelles hautes mais peu ou pas épiées, il est possible de pâturer au fil ou de pratiquer temporairement le topping (cf. paragraphe suivant).

Le topping : une solution d'opportunité pour limiter le tri

Pour prolonger le pâturage avec des hauteurs importantes et peu/pas d'épis, une des solutions consiste à **faucher avant le passage des animaux et de faire pâturer l'herbe fauchée : le topping.**

Le topping est une solution temporaire qui permet de faire pâturer des parcelles avec des hauteurs élevées, à un moment où on manque de jours d'avance, les autres parcelles sont alors trop basses en hauteur entrée. C'est une façon de temporiser, en limitant les refus.


Il est conseillé pour cela de faucher les parcelles le soir, quand l'herbe est sèche et de faire pâturer dans les 48h suivantes. On cherche à atteindre 50% MS en topping au moment du pâturage, ce qui permet d'augmenter les quantités d'herbe ingérées (moins d'encombrement). Faucher haut (9 à 10 cm) permet d'être au-dessus des bouses et de laisser de la hauteur car les animaux pâturent l'herbe coupée mais aussi une partie de l'herbe encore sur pied sous l'herbe fauchée.



Profiter du temps sec pour faucher

Les conditions météo se prêtent à la fauche en foin ou en enrubannage : pas de pluie prévue, les températures sont élevées et un vent d'est est prévu dans les 10 prochains jours. Attention cependant au ray-grass anglais et au trèfle blanc qui séchent difficilement. Il serait alors plus opportun de les valoriser en pâturage ou en enrubannage.

Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr