


Le ralentissement se poursuit

- Augmenter les hauteurs de pâturage : oui, mais pas trop...
- Adapter le pâturage au potentiel immédiat de la prairie
- Bien stocker les foins précoces

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 08/05 au 14/05	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	47	9,8
Zone Intermédiaire	32	9,7
Zone Sud	Nord Loire	46
	Sud Loire	39
MOYENNE REGION	41	10,1



Le niveau de pousse continue sur sa lancée, pénalisé par l'absence de précipitations et des températures à plus de 25 °C.

En fonction des secteurs, une réponse peut être attendue en cas de précipitations significatives.

L'objectif reste donc encore de ménager les prairies, afin de privilégier la repousse sur les cycles à venir.

Augmenter les hauteurs de pâturage : oui, mais pas trop...

Maintenant que l'essentiel des épiaisons est derrière nous (parmi les graminées les plus courantes seuls les ray grass anglais tardifs et les fléoles restent à épier), la priorité est surtout de ménager et de préparer la prairie à s'adapter aux conditions météo du moment.

Ainsi, il convient dès maintenant de laisser davantage de résidus à la prairie, afin d'en limiter l'épuisement, et de garder de la fraîcheur au sol. Attention cependant à ne pas tomber dans les extrêmes inverses, et de sortir trop tôt. Ainsi, il semble raisonnable de viser une hauteur de sortie aux alentours de (6-7 cm) herbomètre, afin de consommer les épis pour qu'ils ne repartent pas et de conserver un décalage de hauteur suffisant dans le circuit de pâturage, une qualité de prairie satisfaisante, et pour favoriser la repousse.

Adapter le pâturage au potentiel immédiat de la prairie


Des épisodes orageux sont annoncés cette semaine, les précipitations ont été globalement nulles au niveau de la région le week-end dernier sauf localement jusqu'à 50 mm, il est possible que l'état des prairies puisse évoluer selon trois cas de figure.

Ainsi, en fonction des secteurs, et parfois au sein même de l'exploitation, il convient de nuancer et d'adapter les pratiques de pâturage à l'état global de la prairie. Ainsi, voici les différentes situations à distinguer aujourd'hui :

- **Les prairies dont la flore sèche et/ou les feuilles se rétractent** : Si cela touche la majorité d'un circuit de pâturage, il conviendra de rapidement transiter vers une ration d'été avec un apport à l'auge, et au besoin de rester sur une ou des parcelles parking.
- **Les prairies étant soit sur sol profond, soit ayant été convenablement arrosées** n'ont pour leur part pas spécifiquement besoin d'adaptations de pratiques, surtout si les stocks sur pieds sont importants. Sur ce type de prairies, la gestion des épis prime encore sur le reste pour la conduite.
- Enfin, **les situations intermédiaires**, qui sont majoritaires aujourd'hui, et dont les adaptations les plus pertinentes sont celles développées dans le paragraphe précédent. Pour les parcelles récemment exploitées, attendre d'avoir 10 cm en entrée de parcelles et des retours à plus de 25 jours sauf flore en épiaison ou en dessèchement marqué.

Bien stocker les foins précoces

Les conditions météo se prêtent à poursuivre le séchage des foins précoces après pressage, car ils sont généralement assez limite en terme de taux de MS. Mieux vaut les laisser au champ et/ou sur une plate-forme non couverte tant que la météo est propice au séchage, plutôt que de prendre de risque de les rentrer à peine secs.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr