


Des orages plus ou moins salvateurs

- Point météo
- Des situations très contrastées
- Des créneaux pour le foin
- Anticiper les achats de semences prairiales.

		Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 22/05 au 28/05	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord		NM	NM
Zone Intermédiaire		38	8,7
Zone Sud	Nord Loire	40	9,7
	Sud Loire	23	9,4
MOYENNE REGION		34	9,2



Avec 34 kgs de MS/ha/ jour, le niveau de pousse n'a pas évolué par rapport à la semaine précédente. Celui-ci devrait cependant progresser davantage lorsque les sols ont été réhumidifié.

NB : plusieurs sites n'ont pas été mesurés en raison du pont de l'ascension.

Point météo

Les cumuls de précipitations en mai comme en avril sont inférieurs aux normales (1981-2010). Les pluies d'orages tombées aux alentours du 22 mai rendent les situations contrastées au niveau de la région. Si la Mayenne et la Loire Atlantique ont eu globalement des précipitations plus régulières (environ 40 mm), dans chaque département ligérien, il y a à la fois des secteurs bien arrosés et d'autres où la sécheresse s'accroît avec pour conséquence un arrêt de la pousse d'herbe.

Des orages sont annoncés pour les 1ers jours de juin. Si les pluies se montrent conséquentes, associées à une remontée des températures, la pousse peut avoisiner les 30 kgs MS/ha/J au sud de la région et 50 kgs MS/ha/J au nord.

Des situations très contrastées

Dans les exploitations où les sols ont bien été réhumidifiés, le potentiel pâturable demeure. La part de pâturage dans les rations va pouvoir être maintenue voire augmentée. Une fois les épis maîtrisés, l'allongement des cycles de retour sur parcelle permettra de faire durer le pâturage avec un bon niveau de qualité et ceci grâce au trèfle blanc qui sait profiter de ces situations.

A l'inverse, la pousse s'arrête dans les exploitations où les précipitations ont été < à 20 mm vers la vingtaine de mai. Pour ces exploitations, le recours à une conduite estivale s'impose : limitation de la durée de pâturage/jour, ration à l'auge presque exclusive et maintien sur des parcelles parking afin de ne pas compromettre la productivité des autres parcelles.

Suivant les situations, toujours dans un contexte de prix élevé des intrants, mettre en adéquation le volume et la qualité des prairies avec les besoins des différents lots présents.

Des créneaux pour le foin

De nombreuses fauches ont eu lieu au moment de l'ascension en raison d'une fenêtre météo favorable d'une semaine. Les premiers jours, la rosée était très présente et l'humidité des sols ralentissait le séchage. Il conviendra d'être à nouveau prudent en attendant pour mettre les bottes sous les hangars.

Après les orages annoncés, les parcelles non encore exploitées devront être fauchées pour assurer des repousses en pâturage d'été en profitant des précipitations. Les parcelles nécessitant encore une maîtrise d'épis pourront également être orientées en foin si elles ne sont pas pâturées au fil ou grâce au topping.

Gérer les chardons


Avec l'apparition des boutons floraux, c'est le moment pour faucher le chardon commun (isolé et de grande taille). Une section sous le collet est encore plus efficace. Le chardon des champs fleurit plus tard, mieux vaut attendre pour le faucher, sinon vous risquez de lui donner de la vigueur. La première fauche lorsque la hampe florale sera développée l'affaiblira, mais il faudra le refaucher dans l'été lorsqu'il remontera à graines. Des fauches trop fréquentes et pratiquées trop tôt en saison favorisent son développement par ses rhizomes.

Anticiper les achats de semences prairiales

Plus on s'y prend tôt, plus on a de chances d'avoir ce que l'on veut. Le choix d'espèces et de variétés se fera en tirant les conclusions de la productivité des prairies actuellement en place et en s'adaptant au changement climatique. A titre d'exemple, l'introduction de fétuque élevée est préconisée pour avoir des prairies plus rustiques, même dans le circuit des vaches laitières, mais celle-ci doit être introduite progressivement dans le mélange pour que les vaches s'habituent, sous peine de refus au pâturage.

La consultation du site www.herbe-book.org est une précieuse aide quand il s'agit de choisir les meilleures variétés.

Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr