


Des prairies fortement impactées par la chaleur

- Une pousse de l'herbe à nouveau en baisse
- Anticiper les couverts d'été
- Ménager les prairies et les animaux

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 10/06 au 19/06	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	29	8,9	
Zone Intermédiaire	15	8,3	
Zone Sud	Nord Loire	19	8,5
	Sud Loire	21	8,7
MOYENNE REGION	20	8,6	

Avec une moyenne régionale de 20 kg MS/ha/j, la croissance a été divisée par deux depuis une semaine. L'herbe a souffert de la montée des températures de la semaine dernière.



Une pousse de l'herbe à nouveau en baisse

A l'échelle du réseau et quel que soit le département, la pousse de l'herbe est en baisse avec une moyenne régionale de 20kg MS/ha/j. Les mesures de cette semaine ont été faites au début de la canicule, les prairies étaient alors en stress hydrique, mais l'effet de la canicule n'a pas encore pu être mesuré. Les prairies seront alors plus mises à mal suite à ces derniers jours.

Les températures s'annoncent plus clémentes dans les prochaines semaines avec des épisodes orageux. Cependant, la localisation et la quantité d'eau apportée par les orages sont difficiles à prévoir : de 5 à 40 mm sont annoncés dans les 15 jours. Cela pourrait permettre aux prairies encore un peu productives de se maintenir.

La pousse de l'herbe va alors être dépendante des espèces implantées. Les trèfles blancs, trèfles violets et fétuques élevées peuvent encore tirer leur épingle du jeu avec les orages, avec une croissance malgré la chaleur. A cette saison, ce sont les espèces les plus réactives lorsqu'il pleut.

Cependant, la canicule du weekend dernier va sûrement avoir un fort impact et les effets des orages seront minimisés. Ce qui ne nous permet pas d'espérer de reprise de croissance à plus long terme.

Anticiper les couverts d'été


Les moissons ont déjà démarré dans certains secteurs (orge). Elles vont être précoces et les orages consécutifs vont offrir une petite opportunité pour envisager des semis de couverts d'été à récolter avant les semis d'automne. Bien qu'il s'agisse d'une prise de risque, la réflexion doit porter sur l'utilisation qu'on en fera (pâturage, ensilage, enrubannage), notamment dans les élevages avec peu de stocks. Plusieurs couverts sont possibles en implantation de fin de printemps : avoine, moha, sorgho fourrager, trèfle d'Alexandrie, trèfle incarnat, vesce, colza fourrager, RGI...

Ménager les prairies et les animaux

A l'échelle de la région, les hauteurs d'herbe ne permettent pas d'envisager sereinement le pâturage. Nous sommes sur la fin de la période de croissance printanière, et il ne faut pas entamer le potentiel des prairies pour cet automne. Préserver les prairies sur l'été et ne refaire pâturer uniquement que si l'offre permet un vrai pâturage. Attention aux hauteurs entrée et sortie : les hauteurs de sortie des prairies ont tendance à baisser : garder une hauteur de 6-7 cm afin de limiter l'assèchement du sol.

La canicule a fortement impacté la production de ces derniers jours, notamment palpable en production laitière. Il est important de ménager les animaux, malgré la baisse de température des prochains jours. Il est préférable de ne pas exposer les animaux pendant les pics de chaleur (notamment l'après-midi) et d'augmenter l'apport à l'auge en cas de stock sur pied limitant, afin de laisser le temps aux prairies de se rétablir. Si le choix s'est porté sur la mise en place de parcelles parking, il convient d'être attentif pour les laitières aux risques de mammites ou de butyriques dus aux attroupements. Une rotation des parcelles parking peut permettre de limiter ces risques sanitaires.

Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr