


Ralentissement de la croissance

- Grace à des températures modérées semaine 26
- Gestion des épisaisons
- Ouverture des silos
- Hauteur sortie, pâturage d'été

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 28/06 au 04/07	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	12	8,0	
Zone Intermédiaire	19	7,8	
Zone Sud	Nord Loire	14	8,0
	Sud Loire	18	9,0
MOYENNE REGION	16	8,3	



Sur les 3 dernières semaines de juin, la pousse se situe en moyenne régionale aux alentours de 20 kgs de MS/ha/Jour.

Gestion des épisaisons

Certaines variétés tardives sont toujours en épisaison, et, les tiges s'endurcissent, augmentant ainsi les refus dans les parcelles.

Quelles solutions adopter ? Le topping, qui vise à faucher et faire ramasser la biomasse par un troupeau d'animaux. Cette méthode, maintenant bien répandue chez bon nombre d'éleveurs, donne de bons résultats.

Laisser les épisaisons. Le but est de conserver la fraîcheur, préserver le sol. La plante ira jusqu'à la production de graines et ainsi, enrichira le stock grainier du sol. Il est évident que cette technique est et doit être réalisée sur parcelle avec peu d'indésirables vivaces (Chardons des champs, Rumex). En présence de quelques bisannuelles ou annuelles dites 'à fleurs jaunes' comme les crépides, la flore herbacée pourra les concurrencer et donc les faire régresser.

Laisser des épis dans une parcelle de pâturage, ce n'est pas sale ! C'est la vie de la prairie, et il faut l'accepter.

Retour à la parcelle – ouverture des silos


Avec une croissance maintenant durablement faible (les températures vont monter ces prochains jours et pas de précipitations annoncées), il est impératif d'allonger les temps de retour dans les parcelles et ne pas descendre trop bas dans le but de préserver la ressource herbeuse et le sol. Il est préférable de pâturer la nuit, ou en profitant de la fraîcheur du matin, et compléter à l'auge dans la journée.

Avec une prévision de faible croissance il est conseillé de rouvrir le silo plus vite, afin d'anticiper l'arrêt de la croissance de l'herbe.

Hauteur sortie – pâturage des couverts

Les hauteurs de sortie de pâturage devront rester entre 6 et 7 cm herbomètre afin de préserver le sol et la plante (ne pas épuiser les réserves). Une plante sera beaucoup plus réactive avec l'arrivée de pluie si l'on conserve ses capacités de repousses fin d'été début automne.

Rappel : pour le pâturage du sorgho fourrager, il est nécessaire d'attendre une hauteur de 60 cm (risque d'intoxication à l'acide cyanhydrique de la plante).



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr