


### Une reprise de pousse timide

- Une durée du jour qui influe la pousse
- Adapter la quantité à l'auge pour ne pas surpâturer
- Apport de matière organique (date limite)

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 16/09 au 30/09	Hauteur moyenne (cm)	
<b>Zone Nord</b>	28	7,5	
<b>Zone Intermédiaire</b>	13	6,4	
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	10	6,7
	<b>Sud Loire</b>	13	6,2
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>14</b>	<b>6,7</b>	

Les pluies n'ont pas suffi à ré humecter suffisamment les sols. Malgré des conditions météo idéale pour la pousse.



## Une pousse de l'herbe liée à la durée du jour

Malgré des conditions météo et des températures de sol propices à la pousse de l'herbe, la croissance est très limitée en sol peu profond. A ce jour les sols ne sont pas assez ré humecté. On arrive sur la 2<sup>ème</sup> quinzaine d'octobre avec une durée du jour qui diminue ce qui impactera défavorablement la photosynthèse.

Dans les parcelles à + de 8 cm on constate une bonne croissance contrairement aux parcelles avec des hauteurs faibles 3-4 cm (souvent suite à du surpâturage ou des parcelles où la pousse n'a pas encore reprise).

La clé sera l'adaptation de la durée de pâturage en fonction de la surface mise à disposition et de la quantité distribuée à l'auge. Le surpâturage est souvent lié à une inadéquation entre l'offre prairiale et les besoins du troupeau.

## Echelonner le pâturage

Il peut être intéressant de conserver une petite part de pâturage dans la ration (4-5 kg), cela peut nous permettre d'économiser 1 kg de soja tout en améliorant la santé des animaux.

La portance des sols permet d'optimiser la valorisation des prairies car la portance des sols à ce jour est encore très satisfaisante. Si les conditions se dégradent on pourra s'adapter en accélérant le cycle en diminuant la part à l'auge.

## Gestion des apports organiques

**Réglementairement** les épandages de lisier sur prairies de + 6 mois sont autorisés jusqu'au 15 novembre, et les apports de fumier et compost jusqu'au 15 décembre.

**Agronomiquement** il est fortement recommandé de faire de petits apports réguliers sur prairie : 8 à 12 T de fumier de bovin / ha ou 15-20 m3 de lisier de bovin/ha.

De gros apports risqueraient de favoriser un développement d'adventices annuelles surtout cette année avec des prairies très ouvertes.

Il serait également nécessaire de réaliser des analyses de vos effluents afin d'adapter les quantités aux besoins dans un contexte de prix du minéral très élevé.

Les lisiers sont des effluents à action rapide plutôt destinés à des prairies de fauche en application au printemps (rapidité d'action), et les fumiers-compost en application à l'automne sur des prairies qui nécessitent une matière organique avec une minéralisation lente et échelonnée.

## Plantes invasives

Après une année difficile, de nombreuses plantes indésirables, même invasives ont fait leur apparition. Certaines espèces devront faire l'objet d'une surveillance régulière afin de décider de la période d'intervention (chardons, rumex) et d'autres sont à éradiquer absolument telles que les Datura stramonium (espèce très toxique).



*Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :*

**Chambre d'agriculture Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)

**SEENOVIA** 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)