

Gestion du pic de pousse

- Ajuster la surface à la pousse
- Gérer les épis
- Ajuster la ration en fonction de la qualité de l'herbe

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 08/04 au 14/04	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	83	8,6
Zone Intermédiaire	52	8,8
Zone Sud	Nord Loire	73
	Sud Loire	74
MOYENNE REGION	69	10,8

Les conditions de la semaine passée ont permis aux prairies du réseau d'exprimer pleinement leur potentiel, avec un niveau moyen de 70 kgMS/ha/j. La courbe suit la moyenne décennale. Les prévisions météo laissent à présager que ce « pic » va se généraliser dans les semaines à venir.



Ajuster la surface à la pousse

Le pic de pousse se maintient cette semaine et devrait se maintenir encore pour les 10-15 prochains jours au vu des prévisions météorologiques. Avec des pousses de cette ordre, il est impératif d'adapter la surface par animal sur le circuit pour éviter de se faire déborder par l'herbe.

Pour ajuster les surfaces aux besoins, deux leviers sont possibles aujourd'hui :

- ➔ Sortir un maximum d'effectif, et/ou maximiser la part d'herbe dans la ration
- ➔ Débrayer des surfaces pour constituer des stocks, de sorte de conserver 10 à 15 jours d'avance (Voir les bulletins précédents pour le calcul), sur la surface allouée exclusivement au pâturage.

La surface à avoir par UGB suit ce tableau, par exemple avec 70Kg de pousse 25 ares pâturable/UGB suffisent pour être en 100% pâturage. Le surplus de surface devant être débrayé.

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
50	8	10	13	15	18	20	25	30
55	8	11	14	17	19	22	27,5	33
60	9	12	15	18	21	24	30	36
65	10	13	16	20	23	26	32,5	39
70	11	14	18	21	25	28	35	42
75	11	15	19	23	26	30	37,5	45

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Il est assez opportun de réaliser des débrayages de parcelles dès maintenant pour réaliser des fauches dans les semaines qui arrivent et réintégrer des parcelles ensuite dans le circuit de pâturage (courant mai). Pour de nombreuses exploitations de la région, la pluviométrie du mois d'avril devait assurer une pousse pour le prochain mois.

Gérer les épis

Les épiaisons pour les flores les plus précoces ont lieu. Une gestion de ces parcelles est importante si on veut pouvoir garantir une qualité d'herbe dans le temps. Pour ce faire, deux options sont envisageables :


- Soit réaliser une fauche précoce, si le volume d'herbe est conséquent
- Soit contraindre le pâturage au fil, préférentiellement avec un lot ayant des besoins modestes (génisses par exemple).

Pour les flores plus tardives, il convient d'attendre la fin mai avant d'envisager une gestion des refus. En effet, les épiaisons ne sont pas encore imminentes pour les RGA et une fauche aussi précoce dans la saison ne permettra pas de gérer l'épi.

De plus, de nombreuses annuelles indésirables sont en développement actuellement (chardons, rumex...) et il est plus adapté d'attendre un stade avancé de ces plantes (floraison) pour limiter le risque de repousse après leur fauche. Attendre fin mai permettra de faire d'une pierre deux coups avec la gestion des épis et celle des indésirables.

Ajuster la ration en fonction de la qualité de l'herbe

Les conditions favorables à la pousse actuellement sur la région devrait permettre la fourniture d'un pâturage de haute qualité pour les animaux. Une diminution voire une suppression de la complémentation en systématique est possible pour de nombreux animaux même si un maintien d'une complémentation individuelle peut être justifié pour certains niveaux de production (allaitantes avec des objectifs de repro, laitières à un stade jeune)



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr