

Une croissance toujours limitée

- Adapter le pâturage à la météo
- Redécouper les paddocks
- Faire un état des lieux de l'aménagement parcellaire

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 15 au 30/10	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	11	6,7
Zone Intermédiaire	5	6,6
Zone Sud	Nord Loire	12
	Sud Loire	13
MOYENNE REGION	10	7,4

La pousse de l'herbe reste très modeste sur l'ensemble de la région. Certaines zones ont reçu jusqu'à 150mm ces 15 derniers jours. La stratégie de pâturage ne repose donc pas sur la croissance de l'herbe mais sur la portance. L'herbe sur pied sera toujours disponible quand les conditions de portance seront de retour.



Adapter le pâturage à la météo

Avec les pluies de ces dernières semaines et les pluies annoncées ces 10 prochains jours, une adaptation à deux vitesses est à prévoir selon la dégradation de la portance des sols :

-La portance des sols est encore bonne, les stocks d'herbe sur pied sont suffisants. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une conduite prudente du pâturage pour ne pas dégrader la prairie, la portance peut vite se dégrader. Le mieux est donc de jouer sur la capacité d'ingestion rapide des animaux et ne les sortir que 3 à 4 heures par paddocks, en adaptant la taille des paddocks. Un avancement fil avant-fil arrière permet notamment de garder une homogénéité de la prairie après le passage des animaux. Cependant, il est important de s'assurer que le stock d'herbe sur pied est suffisant avant de mettre les animaux à l'herbe : la capacité d'ingestion des animaux ne sera que meilleure.

-La portance des sols se dégrade sévèrement. La pluie ne va pas s'arrêter d'ici 10 jours, il vaut mieux dans ce cas-là arrêter le pâturage quitte à revenir d'ici un mois quand les pluies se seront calmées. L'herbe sur pied aujourd'hui sera toujours là dans un mois !

Si la décision se porte sur l'arrêt temporaire du pâturage, il vaut mieux adapter la ration avec 1kg de correcteur pour compenser la baisse d'azote. L'herbe d'automne est bonne, l'arrêt du pâturage se fera ressentir dans la production.

Redécouper les paddocks


Pour les animaux à faibles besoins, éviter de les rentrer systématiquement et de distribuer du fourrage. Il serait opportun de les faire tourner sur des paddocks plus petits et de les changer tous les jours pour limiter les dégâts liés à la portance. Là encore, la taille des paddocks dépendra du stock d'herbe.

Faire un état des lieux de l'aménagement parcellaire

Ces temps de météo contraignantes peuvent être le moment de faire le point sur l'état de ses chemins : trous, portance limitante, etc. Ce moment est l'opportunité de repérer les points délicats des chemins qui seront à aménager pour le printemps. Des solutions simples existent pour des petits dégâts de chemins : sables grossiers dans les trous qui vont se tasser avec la pluie, copeaux de bois lorsque la portance est très dégradée...

Comme il a déjà été dit en mai, les haies jouent un rôle important sur la préservation des prairies : préservation du vent d'est, ombre... Et cet automne c'est sur la portance des sols que cela se voit !

Croissance de l'herbe - Réseau Pays de la Loire



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE