


## Être stratégique sur la conduite

- Mettre à l'herbe rapidement
- Organiser les travaux de fauche

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 02/04 au 07/04	Hauteur moyenne (cm)
<b>Zone Nord</b>	<b>48</b>	<b>8,9</b>
<b>Zone Intermédiaire</b>	<b>44</b>	<b>11,7</b>
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	<b>57</b>
	<b>Sud Loire</b>	<b>43</b>
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>49</b>	<b>11,8</b>

La pousse de l'herbe continue sa lancée printanière avec 49kgMS/ha/j. Les difficultés de pâturage impliquent des hauteurs de prairie toujours plus hautes de semaines en semaines. Les prévisions météo des prochains jours indiquent un retour d'un temps plus sec qui va améliorer la portance.



## Mettre à l'herbe rapidement

Les températures de ces derniers jours et l'arrêt de la pluie annoncée pourrait nous permettre de sortir les animaux et déclencher les fauches. Il convient en priorité de faire le tour des prairies pour estimer la portance qui va s'améliorer rapidement et l'état de l'herbe (rouille ?) pour estimer la qualité et la quantité d'herbe. C'est ce tour qui va déterminer la suite. L'herbe présentant beaucoup de rouille ne sera pas bien pâturée puisque peu appétente. On pourra, au choix : faire pâturer puis broyer les refus, ou faire passer un lot d'animaux moins exigeant après les VL, ou basculer directement la parcelle en fauche.

La mise à l'herbe va impliquer d'ajuster rapidement à l'auge pour bien faire nettoyer les prairies de l'herbe accumulée tout l'hiver. On pourra réduire la surface des paddocks offerte par une redivision des paddocks avec un avancement au fil par exemple, tout en réduisant l'apport à l'auge. On pourra distribuer à l'auge le soir et repousser le matin les restes, de manière à ce que les panses ne soient pas pleines à la sortie le matin. Les transitions alimentaires vont être rapides, on peut continuer à mettre de la magnésie et avoir une ration stockée plutôt sèche et fibreuse pour compenser l'herbe avec un taux de matière sèche assez faible.

L'herbe n'est pas encore épiée, mais les hauteurs d'herbe continuent d'augmenter ce qui rend le pâturage plus technique malgré la qualité présente. Pour une meilleure valorisation de l'herbe il faudra alors diviser les surfaces pour bien faire pâturer. Par exemple, pour un troupeau de 80 vaches laitières sur lequel on veut faire pâturer à hauteur de 9kgMS/j/VL, sur une parcelle de 1ha à 11,5cm d'hauteur d'entrée et de sortie à 5,5cm (pour une parcelle pas encore pâturée de l'année). Nous avons un stock d'herbe pâturable de  $240\text{kgMS/cm/ha} \times 6\text{cm} = 1440\text{kgMS/ha}$ . Pour le troupeau, cela correspond à 2 jours de pâturage. Nous pouvons donc

diviser le paddock en 2. Rediviser les paddocks permettra de ne pas laisser les animaux trier l'herbe au pâturage. Sur la saison, ce sera moins de refus !


## Organiser les travaux de fauche

Les prochains jours sans pluie laissent présager un retour de la portance qui pourrait déclencher les fauches. Cependant, les températures annoncées de la semaine prochaine s'annoncent plus froides et un vent d'est. Il ne faudra pas se précipiter pour garder du stock sur pied à faire pâturer. La pousse risque d'en prendre un coup avec les températures. Pour profiter tout de même des possibilités de pâturage, il faudra toujours garder un stock de 15 jours d'avance.

Pour donner quelques repères avec les moyennes du réseau en ration 100% herbe pâturée :

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 02/04 au 07/04	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
<b>Zone Nord</b>	48	8,9	12	18	24	30	24	30
<b>Zone Intermédiaire</b>	44	11,7	21	31	42	52	42	52
<b>Zone Sud</b>	<b>Nord Loire</b>	58	22	34	45	56	41	52
	<b>Sud Loire</b>	43	23	34	45	56	42	52
<b>MOYENNE REGION</b>	<b>49</b>	<b>11,9</b>						

Pour les prairies de fauche exclusive et les dérobés type RGI, on pourra faucher plus haut qu'habituellement en visant une fauche à 8-9cm. Les premières fauches de cette année s'annoncent conséquente en quantité. Faucher haut sur les prairies de fauche permettra de limiter les butyriques dans les silos.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

**Chambre d'agriculture Pays de la Loire** 02 53 46 62 28 [www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)  
**SEENOVIA** 02 43 64 12 64 [www.seenovia.fr](http://www.seenovia.fr)