

Le rendez-vous
des agriculteurs
innovants !



INNOV' ACTION



Prévention sanitaire : ça « veau » le coup !

Quelques pistes dans la conduite d'élevage

Préparation du vêlage pour que le veau parte du bon pied

- Préparation alimentaire des mères
- Minéralisation enrichie vitamines/OE
- Parasitisme des mères ?
- Case de vêlage nettoyée entre chaque vêlage
- Surface case 15-20m²

Environnement sain pour limiter la pression infectieuse

- Curage
- Nettoyage (eau chaude 90°C => cryptosporidies)
- Désinfection (cf. agent ciblés)
- Vide sanitaire

Le colostrum, un concentré de vie

- Règle des 3Q:
 - Quality: >100gIgG/l
 - Quantity: >2l
 - Quickly : dans les 6h
- Apport IgG mais aussi et surtout: énergie, MG, antioxydants, cellules immunitaires
- Obj: >100g IgG/l soit > 27% réfractomètre de Brix
- Veau nait sans Ig donc sans défense

Soins au veau naissant, un pari sur l'avenir

- Prise colostrale
 - Spontanée
 - Biberon
 - Drencher
- 20 min au vêlage // 40 min/jour/veau malade



Journée organisée

par : Association des éleveurs
Rouge des Prés de la Sarthe
ARP72



Nos partenaires :



Le rendez-vous
des agriculteurs
innovants !




INNOV' ACTION



Prévention sanitaire : ça « veau » le coup !

Exemple des diarrhées néonatales (GENN),
1^{ère} cause de mortalité des veaux

- 100% des élevages naisseurs touchés
- 57% des mortalités avant sevrage



Organiser son travail en amont des vêlages pour gagner du temps et de l'argent

Désinfection: à adapter en fonction des cibles

Vaccination des vaches => enrichir le colostrum en Ac spécifiques

Agent pathogène	Résistance dans le milieu	Désinfectants actifs
Colibacilles, salmonelles	3-6 mois	Désinfectants usuels
Rotavirus, coronavirus	9 mois	Phénols,...
BVD	<15 jours	Désinfectants usuels
Cryptosporidies	1 an (4°C)	NH3 5%, formol 10%, eau bouillante 90°C

Identification des germes ciblés via analyses	Planification du calendrier vaccinal	Le vaccin, une efficacité dépendante d'une bonne prise colostrale
Coliformes (quels types?)	Temps passé < surplus travail en urgence lors de maladie	VA: 2l dans les 6h
- Rotavirus, coronavirus - Salmonelles - BVD	Coût vaccin // pertes directes et indirectes	19% veaux L : 1 ^{ère} buvée spontanée >8h post vêlage

Journée organisée par :

